

Beyfortus[®] está indicado para la prevención de la enfermedad de las vías respiratorias inferiores causada por el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en:

- Recién nacidos y bebés iniciando o durante su primera temporada de VSR.
- Niños hasta 24 meses de edad que continúen siendo vulnerables a padecer enfermedad por el VSR severa, en su segunda temporada.¹

Cómo utilizar Beyfortus[®]

Dosis recomendada

La dosis recomendada en la **segunda temporada** es de 200 mg administrada en dos inyecciones intramusculares (2 x 100 mg).¹

Una inyección intramuscular, preferiblemente en la cara anterolateral del muslo.¹

En pacientes durante su **primera temporada** de VSR, la dosis dependerá del peso:



Momento de la administración



Para los niños nacidos durante la temporada de VSR, Beyfortus[®] se debe administrar **tras el nacimiento**.¹ Por ejemplo, podría administrarse tras el nacimiento, antes del alta hospitalaria o en el vacunatorio.



En niños que han nacido antes de la temporada de VSR, Beyfortus[®] se debe administrar **antes del inicio de su primera temporada** de VSR.¹ Por ejemplo, podría administrarse en un vacunatorio desde marzo lo antes posible para estar protegido desde el inicio de la temporada.^{***}



En niños de hasta 24 meses de edad que continúen siendo vulnerables a padecer enfermedad por VSR severa **durante su segunda temporada** de VSR, Beyfortus[®] debe administrarse **antes del inicio de temporada**.



Beyfortus[®] se puede administrar **concomitantemente con vacunas infantiles**.^{**1}

¹El músculo glúteo no se debe utilizar de forma rutinaria como lugar de inyección, ya que existe el riesgo de dañar el nervio ciático.


^{**}Beyfortus[®] no se debe mezclar con ninguna vacuna en la misma jeringa o vial. Cuando se administra concomitantemente con vacunas inyectables, se debe administrar con jeringas separadas y en diferentes lugares de inyección.

^{***}Beyfortus puede administrarse en cualquier momento de la temporada de VSR, idealmente antes del inicio de la temporada.¹

Cómo almacenar Beyfortus[®]¹

Almacenamiento¹

- Conservar en refrigeración (2-8 °C).
- No congelar.
- No agitar ni exponer al calor directo.
- Conservar la jeringa prellenada en el embalaje exterior para protegerla de la luz.



Periodo de vida

Después de sacarse de la heladera, Beyfortus[®] debe utilizarse dentro de las 8 horas o desecharse.



¹ Prospecto para prescribir Beyfortus[®]. IF-2023-139650554-APN-DECBR#ANMAT.

▼ Este medicamento debe ser utilizado exclusivamente bajo prescripción y vigilancia médica y no puede repetirse sin nueva receta médica.

