


# Que nada te pare


sanofi



3 inyecciones<sup>1</sup>

12 alivio del dolor hasta 12 meses<sup>1</sup>

**Synvisc®** ha sido concebido exclusivamente para la aplicación intraarticular por un médico, para el tratamiento del dolor asociado a la osteoartritis de **rodilla, cadera, tobillo y hombro.**<sup>1</sup>



La viscosuplementación que se consigue mediante el tratamiento con hilano G-F 20 **disminuye el dolor y las molestias**, permitiendo una mayor amplitud de movimiento de la articulación<sup>1</sup>

## ¿Qué es el hilano G-F 20?

El hilano G-F 20 es **biológicamente similar al hialuronato**, un componente del líquido sinovial responsable de su elastoviscosidad. Sin embargo, las **propiedades mecánicas** (elastoviscosas) **del hilano G-F 20 son superiores** a las del **líquido sinovial** y a las **soluciones de hialuronato de concentraciones comparables.**<sup>1</sup>


	Peso molecular Da	Elasticidad Pa (2,5Hz)	Viscosidad Pa
Líquido sinovial normal	6000000	117 ± 13	25 ± 2
Synvisc® (Hilano G-F 20)	6000000	111 ± 13	45 ± 8



Synvisc® es eficaz en **cualquier estadio** de la patología articular.<sup>1</sup>



Synvisc® es **particularmente eficaz** en pacientes que utilizan **activa y regularmente** la articulación afectada.<sup>1</sup>



Los datos clínicos prospectivos de pacientes con osteoartritis de rodilla han demostrado que, tras aplicar una única serie de **tres inyecciones de Synvisc®**, los beneficios del tratamiento se han prolongado **hasta 26 semanas.**<sup>1</sup>



En ensayos clínicos controlados con Synvisc® no hubo diferencias estadísticamente significativas en el número de efectos adversos sistémicos entre el grupo de pacientes que recibió Synvisc® y el que recibió tratamientos de control.<sup>1</sup>

# Que nada te pare

Con Synvisc® que nada le pare en la vuelta al estilo de vida activo.

Synvisc® producen el alivio del dolor de la articulación debido a la osteoartritis con una duración de hasta 26 semanas.<sup>1,2</sup>

#### Referencias:

\*Hasta 52 semanas en osteoartritis de rodilla, con Synvisc® y Synvisc One®. Hasta 26 semanas en osteoartritis de cadera, tobillo y hombro, con Synvisc®. 1. Información para prescribir de Synvisc®. 2. Khangulov V, et al. Retrospective Comparative Analysis of Opioid Use and Intra-Articular Corticosteroid Injections Before and After Initial Treatment of Knee Osteoarthritis with Hylan G-F 20. Open Access Rheumatol. 2020;12:79-85.

**MAT-CO-2301231 V1.0 (07-2023).** Material dirigido al profesional de la salud que prescribe y dispensa. Es estrictamente prohibido compartir este material con terceros. Sanofi no promociona ni promueve el uso de sus productos/ medicamentos en forma diferente al aprobado por la Autoridad regulatoria e incluida en la información de prescripción o ficha técnica. Mayor información a disposición en el Departamento Médico: En Colombia: Sanofi-Aventis de Colombia S.A. Transversal 23 N° 97-73 - Edificio City Business. Piso 8. Bogotá D.C. Teléfono: 621 4400 - Fax: 744 4237 infomedica.colombia@sanofi.com En Bolivia, Centro América y Caribe: Sanofi-Aventis de Panamá S.A. Torre Evolution, piso 32, Calle 50 y Av. Aquilino de la Guardia Obarrio - Ciudad de Panamá, República de Panamá Telf.: (507) 382-9500. En Ecuador: Sanofi-Aventis del Ecuador S.A. Centro Corporativo Ekopark, Vía Antigua a Nayón y Av. Simón Bolívar, torre 2, piso 7, oficina 702. Telf.: (593) 25002937 infomed.pac@sanofi.com En Perú: Sanofi-Aventis del Perú. Av. Javier Prado Este 444 Piso 15, San Isidro, Telf. (+511) 631-9100. Informaciónmedica@sanofi.com Synvisc 2 mL hylan G-F 20. (8.0 mg ± 2.0 mg per mL). Para Perú: RS – DM5247E. Synvisc-One® 6 mL hylan G-F 20. (8.0 mg ± 2.0 mg per mL). Para Perú: RS – DM1812E. Para reportes de eventos adversos: En Colombia: Farmacovigilancia.colombia@sanofi.com En todo Caribe, Centroamérica, Ecuador y Bolivia: drugs.camwi@sanofi.com Perú: Farmacovigilancia.peru@sanofi.com



Información para prescribir

**SYNVISC**  
HYLAN G-F 20

sanofi