


Simposio

Vacuna aP-hexavalente en América Latina: una visión del presente para el futuro

María Luisa Ávila-Agüero (Costa Rica), Ángela Gentile (Argentina), Federico Martinón-Torres (España), Jaime Rodríguez (Chile)

Complejidad del control de B. pertussis¹



Ángela Gentile

“Para lograr el control de la tos ferina, se requieren múltiples estímulos de inmunización, vacunando en distintas etapas de la vida.”

Diferencias entre las vacunas disponibles^{1,2}

	Vacunas de células enteras (wP)	Vacunas acelulares (aP)
Contenido	Suspensión de bacilos muertos	Antígenos de <i>B. pertussis</i> (*)
Eficacia inicial	Menor a aP	Más alta y consistente que wP
Caída de protección a largo plazo	Similar para ambas vacunas	
Perfil de seguridad	Más reactogénicas	Menor reactogénesis (mayor aceptabilidad y confianza)

(*) Contienen algunos de los siguientes antígenos: toxina pertussis, hemaglutinina filamentososa, pertactina, aglutinógenos de ≥ 2 tipos de fimbrias

Ventajas del uso de vacunas combinadas con componente aP¹

- Simplificación y mayor aceptación de los esquemas de vacunación
- Mejores coberturas de vacunación
- Inducción de altos niveles de anticuerpos
- Menor costo de almacenamiento y transporte



Dra. María Luisa Ávila-Agüero

“Los estudios han demostrado que las vacunas aP tienen una eficacia más consistente y elevada, en contraposición a los resultados más heterogéneos con las vacunas wP.”

Experiencia con las vacunas combinadas con componente aP en América Latina³



Buen perfil de efectividad y aumento de la cobertura de inmunización



Menos reportes de ESAVI y aumento de la confianza en las vacunas



MEJOR EQUIDAD EN SALUD



Jaime Rodríguez

“La incorporación y administración de las vacunas al sistema de inmunizaciones debe ser eficiente, segura, eficaz y equitativa.”

Mensajes destacados



Federico Martinón Torres

“El resurgimiento de la tos ferina es complejo y multifactorial: entre sus causas se incluye la reducción de las coberturas vacunales en el período posterior a la pandemia.”

- La **prioridad de la vacunación** contra la tos ferina es proteger al lactante.
- Las vacunas aP tienen una efectividad comparable a la de las vacunas wP, pero son más seguras y menos reactogénicas, lo que mejora su aceptación.
- La **solución de la tos ferina pasa por vacunar más y mejor** a lo largo de toda la vida con las herramientas disponibles.

Abreviaturas

aP: vacuna acelular; ESAVI: eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización; wP: vacuna con células completas

Referencias:

1. Presentación de la Dra. Ángela Gentile (Argentina), SLIPE, 12 de noviembre de 2025.
2. Presentación de la Dra. María Luisa Ávila-Agüero (Costa Rica), SLIPE, 12 de noviembre de 2025.
3. Presentación del Dr. Jaime Rodríguez (Chile), SLIPE, 12 de noviembre de 2025

Material de propiedad exclusiva de Sanofi dirigido al profesional de la salud. Material restringido para terceros. Para mayor información comunicarse con el departamento médico de Argentina: Sanofi Health Argentina S.A. - Tucumán 1, Piso 4º, C1049AAA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina - Tel: (011) 4732-5000 - www.sanofi.com.ar dmedica@sanofi.com; Tel.: (+ 54)4732-5000. Chile: Sanofi Vaccines Chile SA - Av. Presidente Riesco 5435, of. 1802, Las Condes, Santiago, Chile Tel: 233408400 - www.sanofi.cl. Paraguay: dmedica@sanofi.com Sanofi-Aventis Paraguay S.A. - Edificio SkyPark, Aviadores del Chaco N° 2581, Torre 2, Piso 13, Asunción, Paraguay. Tel: (595) 21 288 1000 - www.sanofi.com.py Colombia: Sanofi-Aventis de Colombia S.A. Transversal 23 N° 97-73 - Edificio City Business. Piso 8. Bogotá D.C. Teléfono: 621 4400 - Fax: 744 4237. infomedica.colombia@sanofi.com. Peru: Sanofi-Aventis del Perú. Av. Javier Prado Este 444 Piso 15, San Isidro, Telf: (+511) 631-9100. Informacionmedica@sanofi.com Bolivia, centro américa y caribe: Sanofi-Aventis de Panamá S.A. Torre Evolution, piso 26, Calle 50 y Av. Aquilino de la Guardia Obarrio- Ciudad de Panamá, República de Panamá Telf: (507) 382-9500. infomed.pac@sanofi.com Ecuador: Sanofi-Aventis del Ecuador S.A. Centro Corporativo Ekopark , Vía Antigua a Nayón y Av. Simón Bolívar, torre 2, piso 7, oficina 702. Telf: (593) 2500-3020. infomed.pac@sanofi.com. Mexico: Av. Real de Mayorazgo Torre M Piso 25 Col. Xoco, Benito Juárez CP. 03330 México, Ciudad de México. Teléfono: 55 2586 440. Chile: Sanofi Vaccines Chile SA - Av. Presidente Riesco 5435, of. 1802, Las Condes, Santiago, Chile Tel: 233408400 - www.sanofi.cl.