

sanofi

Aider à protéger les
nourrissons pendant leur
première saison contre
le VRS avec Beyfortus^{MD*†}

Beyfortus^{MD}.
Avant le VRS.

Beyfortus^{MD} protège votre bébé contre la maladie du virus respiratoire syncytial (VRS) pendant sa première saison de VRS. Il peut également être administré à des enfants de moins de 2 ans qui sont vulnérables à la maladie du VRS sévère pendant leur deuxième saison de VRS.

 **Beyfortus**^{MD}
(nirsévimab)

* Une protection à 100% n'est pas garantie.

† Sanofi et AstraZeneca sont en collaboration pour le développement et la commercialisation de Beyfortus^{MD}.

Beyfortus^{MD} pourrait être financé par l'État dans votre province ou territoire (avec des critères). Consultez votre médecin pour savoir si Beyfortus^{MD} est couvert pour votre bébé.



Qu'est-ce que le VRS?

Le virus respiratoire syncytial (VRS) est un virus respiratoire courant qui cause généralement des symptômes légers (maladie semblable au rhume), mais qui peut causer une maladie sévère, y compris une bronchiolite (inflammation des petites voies respiratoires dans les poumons) et une pneumonie (infection des poumons) qui peut entraîner une hospitalisation ou même la mort.

Les symptômes légers peuvent inclure un écoulement nasal, des éternuements et de la toux, tandis que les symptômes sévères peuvent inclure une respiration sifflante et des problèmes respiratoires.

La bronchiolite (bron-chio-lite)

est une infection virale des plus petites voies respiratoires des poumons (bronchioles). Lorsque les bronchioles enflent et deviennent enflammées, le mucus peut s'accumuler, ce qui entraîne une congestion et des problèmes respiratoires. **La plupart des cas de bronchiolite sont causés par le VRS.**

La pneumonie (pneu-mo-nie)

est une infection pulmonaire qui peut causer une toux légère à sévère, de la fièvre et de la difficulté à respirer.

Comment le VRS se propage-t-il?

Le VRS se propage lorsque des gouttelettes provenant d'une toux, d'un éternuement ou d'une surface infectée entrent dans les yeux, le nez ou la bouche.



Le meilleur moment pour en apprendre davantage sur le VRS est avant que votre bébé n'en soit atteint.

Saison du VRS

Le virus est généralement plus courant pendant l'hiver (connu sous le nom de saison du VRS), mais il peut commencer plus tôt ou durer plus longtemps dans certaines régions du pays. Votre professionnel de la santé peut vous dire quand la saison du VRS commence dans votre région.

Qui est à risque?



La maladie du VRS sévère peut entraîner l'hospitalisation des nourrissons, y compris ceux qui sont en bonne santé et qui sont nés à terme, au cours de leur première saison, ainsi que ceux qui sont nés prématurément ou avec des maladies sous-jacentes.

Une étude dont les données ont été recueillies dans quatre centres aux États-Unis entre octobre 2014 et avril 2015 a démontré que 67% des enfants âgés de 2 ans hospitalisés en raison du VRS n'avaient aucune maladie sous-jacente signalée*.



Les infections par le VRS peuvent passer de légères à sévères en quelques jours, et une maladie sévère peut entraîner une hospitalisation.



Bien que la plupart des cas de VRS soient légers, il n'est pas possible de prédire quels nourrissons en bonne santé pourraient tomber gravement malades et se retrouver à l'hôpital.

* Selon une étude américaine, avec des données sur 1 554 hospitalisations associées au VRS chez des enfants âgés de < 2 ans recueillies dans quatre centres du réseau de surveillance de l'hospitalisation en cas d'influenza (FluSurv-NET) (Californie, Géorgie, Minnesota et Oregon) entre octobre 2014 et avril 2015.

À quoi sert Beyfortus^{MD} ?

Beyfortus^{MD} protège votre bébé contre la maladie du virus respiratoire syncytial (VRS) pendant sa première saison de VRS. Il peut également être administré à des enfants de moins de 2 ans qui sont vulnérables à la maladie du VRS sévère pendant leur deuxième saison de VRS.

Comment Beyfortus^{MD} agit-il?

Beyfortus^{MD} contient l'ingrédient actif nirsévimab, un anticorps à action prolongée qui bloque la protéine dont le VRS a besoin pour infecter l'organisme. Beyfortus^{MD} empêche le virus de pénétrer et d'infecter les cellules humaines et fournit une protection directe et en temps opportun contre la maladie du VRS qui durera au moins 5 mois, ce qui correspond à une saison typique du VRS.

Quels sont les ingrédients de Beyfortus^{MD} ?



Ingrédient médicinal: nirsévimab

Ingrédients non médicinaux: chlorhydrate de L-arginine, L-histidine, chlorhydrate de L-histidine, polysorbate 80, sucrose et eau pour injection.

Beyfortus^{MD} ne contient aucun agent de conservation.

Comment Beyfortus^{MD} est-il administré?



Beyfortus^{MD} est administré par un professionnel de la santé en une **seule injection** dans le muscle. Il est généralement administré dans la partie externe de la cuisse.



Beyfortus^{MD} doit être administré avant la saison du VRS. Si votre enfant naît pendant la saison du VRS, Beyfortus^{MD} doit être administré dès que possible après la naissance.



Beyfortus^{MD} peut être administré en même temps que les vaccins pendant la même visite.

N'utilisez pas Beyfortus^{MD} si :



votre enfant est allergique au nirsévimab ou à l'un des autres ingrédients de ce médicament. Si cela s'applique à votre enfant, ou si vous n'êtes pas certain, consultez le professionnel de la santé de votre enfant.

Pour éviter tout effet secondaire et assurer la bonne utilisation du médicament, consultez le professionnel de la santé de votre enfant avant que votre enfant prenne Beyfortus^{MD}. Informez-le de l'état de santé ou des problèmes de votre enfant, notamment s'il présente :

- un faible nombre de plaquettes sanguines (qui aident à la coagulation du sang), un problème de saignement ou des bleus qui se forment facilement ou s'il prend un anticoagulant (pour prévenir la formation de caillots sanguins).

Informez le professionnel de la santé de votre enfant ou obtenez immédiatement une assistance médicale si vous remarquez des signes d'une réaction allergique, comme :



une difficulté à respirer ou à avaler;



une enflure du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge;



des démangeaisons sévères de la peau, avec une éruption cutanée rouge ou des bosses surélevées.

Informez le professionnel de la santé de votre enfant de tous les médicaments que prend votre enfant, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels et les produits de médecine douce.

Beyfortus^{MD} n'est pas connu pour interagir avec d'autres médicaments. Toutefois, indiquez au professionnel de la santé de votre enfant si votre enfant prend, a récemment pris ou pourrait prendre d'autres médicaments.

Si vous croyez que votre enfant a reçu trop de Beyfortus^{MD}, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même s'il ne présente aucun symptôme.

Effets secondaires possibles

Voici une liste non exhaustive des effets secondaires possibles que votre enfant pourrait éprouver lors de la prise de Beyfortus^{MD}. Si votre enfant ressent tout effet secondaire non indiqué qui ne fait pas partie de cette liste, avisez le professionnel de la santé de votre enfant.

Les effets secondaires peuvent inclure :

Peu fréquents (pouvant toucher jusqu'à 1 enfant sur 100)



Éruption cutanée



Réaction au site d'injection (c.-à-d. rougeur, enflure et douleur à l'endroit où l'injection est administrée)



Fièvre

Si votre enfant présente un symptôme ou un effet secondaire difficile à supporter qui n'est pas mentionné ici ou si celui-ci devient suffisamment grave pour le gêner dans l'accomplissement de ses activités quotidiennes, parlez-en au professionnel de la santé de votre enfant.

Signalement des effets secondaires

Vous pouvez signaler les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit de santé à Santé Canada :



En visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur la façon de procéder pour faire une déclaration en ligne, par courriel ou par télécopieur;



ou

en téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur Beyfortus^{MD} ou le VRS



Communiquez avec le professionnel de la santé de votre enfant



Visitez Beyfortus.ca et scannez pour vous inscrire et recevoir un rappel du moment où prendre votre rendez-vous



Scannez pour en savoir plus

Vous pouvez aussi trouver l'intégralité de la monographie du produit, qui est destinée aux professionnels de santé et inclus l'intégralité des renseignements sur le médicament pour le patient, en visitant the site internet du fabricant : <https://www.sanofi.com/assets/countries/canada/docs/products/vaccines/beyfortus-fr.pdf> ou en appelant le 1-800-265-7927.

Questions pour votre médecin



Pour vous aider à avoir une discussion éclairée avec le médecin de votre nourrisson au sujet du VRS et de la protection par Beyfortus^{MD}, voici quelques questions qui valent la peine d'être posées:

- Quelles sont les mesures que je peux prendre pour aider à limiter la propagation du VRS?
- Existe-t-il un moyen de prédire si l'infection par le VRS de mon nourrisson sera légère ou grave?
- Comment Beyfortus^{MD} peut-il aider à protéger mon nourrisson contre le VRS?

sanofi

Copyright 2025 © Sanofi. Tous droits réservés.
MAT-CA-2500209F-v1.0-06/2025

MEMBRE DE
MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA



Beyfortus^{MD}
(nirsévimab)