VERORAB®

Inactivated Rabies Vaccine

Kun for helsepersonell

VERORAB®

- Verorab er indisert til pre- og post-eksponeringsprofylakse mot rabies hos alle aldersgrupper. Skal brukes i henhold til offisielle anbefalinger[1]

Administrasjonsmåte[1]

- Kan administreres intramuskulært (IM) eller intradermalt (ID)
- IM: 0,5 ml rekonstituert vaksine
- ID: 0,1 ml rekonstituert vaksine
- Skal ikke injiseres i seteregionen eller intravaskulært
- Pakning: 1 hetteglass med pulver + 0,5 ml væske i ferdigfylt sprøyte

Oppbevaringsbetingelser[1]

- Oppbevares i kjøleskap (**2°C – 8°C**). Skal ikke fryses

Samtidig administrering[1]

- Verorab kan administreres samtidig med Vi polysakkaridvaksine mot tyfoidfeber ved samme vaksinasjonsbesøk, ved bruk av to forskjellige injeksjonssteder

Sikkerhetsprofil[1]

- Bivirkningene er vanligvis milde til moderate, oppstår innen 3 dager og går som regel over i løpet av 1–3 dager
- Vanligste bivirkningene: hodepine, myalgi, malaise og smerte på injeksjonsstedet
- Lokale reaksjoner (smerte, erytem, hevelse) er vanlige, særlig etter intradermal administrasjon
- Feber og influensalignende symptomer kan forekomme
- Hos pediatrisk populasjon under 18 år: irritabilitet, søvnighet og utrøstelig gråt

PrEP-regime (preeksponeringsprofylakse):[1]

- For primær immunisering ved preeksponering kan individer vaksineres i henhold til ett av vaksinasjonsregimene presentert i tabell 1 og i henhold til offisielle anbefalinger når tilgjengelige

Boosterdose bestemmes ut fra eksponeringsrisiko og serologiske tester (≥0,5 IE/ml rabies-nøytraliserende antistoffer). Én dose: 0,5 ml IM eller 0,1 ml ID i henhold til WHO-anbefalinger

PrEP regime[1]

	D0	D27	D21 eller D28
Intramuskulær administrasjon (0,5 ml per dose)			
3-doseregime			
1-ukeregime*			
Intradermal administrasjon (0,1 ml per dose)**			
1-ukesregime*			

Tabell 1

*Skal ikke brukes hos immunsupprimerte
**Injeksjon i begge lår (spedbarn/småbarn) eller begge overarmer (barn/voksne)

VERORAB®

Inactivated Rabies Vaccine

VERORAB®
Inactivated Rabies Vaccine

PEP-regimer (posteksponeringsprofylakse):[1]

- PEP skal startes så raskt som mulig etter mistenkt rabieseksponering
- **Umiddelbar sårbehandling:** grundig vask med såpe/vann og evt. virusdrepende middel før vaksine/immunglobulin
- Vaksinasjon i henhold til offisielle anbefalinger, også hos personer tidligere vaksinert (PrEP eller tidligere PEP)

Posteksponeringsprofylakse hos ikke-vaksinerte individer[1]

	D0	D3	D7	D14	D21	D28
Rabiesimmunglobuliner bør administreres samtidig som vaksinen ved kategori III-eksponering (WHO-klassifisering)**						
Intramuskulær bruk (0,5 ml per dose)						
Intramuskulær Essen protokoll intramuskulær bruk – 0,5 ml/dose						
Intramuskulær Zagreb protokoll intramuskulær bruk – 0,5 ml/dose	*					
Intradermal bruk (0,1 ml per dose)						
Nye Thailand Red Cross (TRC) regime administreres ved injeksjon i 2 separate injeksjonssteder						
Institute Pasteur of Cambodia (IPC) regime administreres ved injeksjon i 2 separate injeksjonssteder						
4-steder 1-uke intradermalt regime intradermal bruk						

Tabell 2

*én intramuskulær injeksjon i den anterolaterale regionen av hvert lår (hos spedbarn og småbarn) eller i hver deltamuskel (hos eldre barn og voksne)
**WHO kategori III: transdermale bitt/riper, slikk på skadet hud, eksponering av slimhinner for spytt, kontakt med flaggermus

Posteksponeringsprofylakse av allerede vaksinerte individer[1]

	D0	D3
Rabiesimmunglobulin er ikke indisert i disse tilfellene		
Intramuskulært - 0,5 ml per dose		
2-dagers regime		
Intradermalt - 0,1 ml per dose		
2-dagers regime		
4-steder 1-dag regime		

Tabell 3

VERORAB® sanofi

AIP 1 sett: 644,27

Referanser:

1. Verorab SPC. 04.11.2025

For fullstendig preparatomtale søk etter Verorab på www.legemiddelsok.no

sanofi

MAT-NO-2600062-V1.0-03/2026