

POMPE LOPD




El 74% de los pacientes presentan al momento del diagnóstico debilidad diafragmática con signos y síntomas de compromiso respiratorio.

Ante la presencia de una combinación de debilidad muscular axial y proximal, recuerda evaluar los síntomas y signos de compromiso respiratorio.

Piensa en Pompe.

Es tan simple como una gota de sangre.



Para mayor información contactar a diagnostico.conosur@sanofi.com

INFORMACIÓN DESTINADA A LOS PROFESIONALES FACULTADOS PARA PRESCRIBIR O DISPENSAR MEDICAMENTOS. Mayor información disponible a petición.

Argentina: Genzyme de Argentina S.A. - Av. Fondo de la Legua 161 - C.P. BJE1609 - Boulogne, Prov. de Buenos Aires, Argentina - Tel: (011) 4708-6900 - www.sanofi.com.ar. Chile: Sanofi-aventis de Chile S.A. - Av. Presidente Riesco 5435, of. 1802, Las Condes, Santiago, Chile Tel: 233408400 - www.sanofi.cl. Paraguay: Sanofi-Aventis Paraguay S.A - Av. Costanera y Calle 3, Parque Industrial Barrail. Asunción, Paraguay. Tel: (595) 21 288 1000 - www.sanofi.com.py. Uruguay: Sanofi-aventis Uruguay S.A. - Héctor Miranda 2361 Oficinas 1001, CP 11300 - Montevideo. Tel: 2710 3710 - www.sanofi.com.uy.
Ref.: 1. Van der Beek N et al. Clinical features and predictors for disease natural progression in adults with Pompe disease: a nationwide prospective observational study. Orphanet J Rare Dis. 2012;7:88 2. Kishnani PS, Steiner RD, Bali D, et al. Pompe disease diagnosis and management guideline. Genet Med. 2006;8(5):267-288. 3. Goldstein JL, Young SP, Changela M, et al. Screening for Pompe disease using a rapid dried blood spot method: experience of a clinical diagnostic laboratory. Muscle Nerve. 2009;40(1):32-36. MAT-AR-2100886, v0.1/ 06.2021