




STAMARIL®

- Stamaril er en levende, svekket vaksine som gir beskyttelse mot virussykdommen gulfeber. Gulfeber oppstår i visse deler av verden og spres til mennesker gjennom stikk av infiserte mygg¹⁻²
- Vaksinen kan brukes hos personer over ni (unntaksvis seks) måneders alder¹⁻²

Rask immunrespons og høy serokonversjonsrate¹

- Beskyttende immunrespons oppstår fra ca. 10 dager etter vaksinasjon
- **Voksne:** Serokonversjonsrate på 93–100 % 28 dager etter vaksinasjon
- **Pediatrisk populasjon:** Serokonversjonsrate 99,7 % hos barn 12–13 måneder og 90–100 % hos barn og unge 2–17 år

Langtidsimmunitet¹

- Én dose (0,5 ml) gir beskyttelse i minst 10 år og kan gi livsvarig immunitet
- Revaksinasjon kan være nødvendig ved utilstrekkelig immunrespons eller fortsatt smitterisiko, i henhold til nasjonale retningslinjer

Administrasjonsmåte¹

- Subkutan injeksjon av vaksinen er foretrukket
- Vaksinen kan også gis intramuskulært i henhold til offisielle retningslinjer
- Skal ikke injiseres intravaskulært

Oppbevaring og holdbarhet¹


- Holdbarhet 3 år. Etter rekonstitusjon skal vaksinen brukes umiddelbart
- Oppbevares i kjøleskap (2–8 °C), må ikke fryses, og skal oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys

Bruk¹

- Én enkelt dose på 0,5 ml
- Indikert for aktiv immunisering mot gulfeber hos personer som reiser til, gjennom eller bor i områder med risiko for smitte, hos reisende som trenger internasjonalt vaksinasjonssertifikat, og hos personer som håndterer potensielle smittestoffer (f.eks. laboratoriepersonell)
- Vaksinen bør gis minst 10 dager før innreise til endemisk område
- Internasjonalt gulfebersertifikat er gyldig 10 dager etter vaksinasjon og livet ut²

Advarsler og forsiktighetsregler¹

- **Barn 6–9 måneder** bør kun vaksineres under spesielle forhold (f.eks. ved utbrudd) og etter gjeldende anbefalinger
- **Gravide og ammende** bør ikke vaksineres med mindre det er strengt nødvendig, etter nøye nytte-/risikovurdering
- **Personer >60 år:** bruk med forsiktighet pga. økt risiko for alvorlige og potensielt fatale bivirkninger
- **Vaksinasjon bør utsettes** ved feber eller akutt sykdom
- Hos personer på **midlertidig immunsuppressiv behandling** bør vaksinasjon utsettes til immunfunksjonen er gjenopprettet





Kontraindikasjoner¹

STAMARIL® skal ikke gis til personer med:

- **Overfølsomhet** mot virkestoff, hjelpestoffer, egg eller kyllingproteiner
- **Alvorlig hypersensitivitetsreaksjon** (f.eks. anafylaksi) etter tidligere dose gulfebervaksine
- Alder under 6 måneder
- **Immunsuppresjon**, medfødt eller ervervet (inkl. høydose systemiske kortikosteroider, biologiske legemidler, cytotoksiske midler, strålebehandling eller andre immunsvikt-tilstander)
- Thymusdysfunksjon (inkl. myasthenia gravis eller thymom) eller tidligere thymektomi

- Symptomatisk HIV-infeksjon eller asymptomatisk HIV med tegn til nedsatt immunfunksjon

Sikkerhetsprofil¹

- **Vanligste bivirkninger hos voksne:** hodepine, asteni, smerter på injeksjonsstedet og myalgi
- **Vanligste bivirkninger hos småbarn:** irritabilitet, gråt og nedsatt appetitt
- Bivirkninger oppstår vanligvis **innen 3 dager** etter vaksinasjon (feber kan oppstå dag 4–14)
- Reaksjonene varer vanligvis **≤3 dager** og er som regel milde, både lokalt og systemisk

AIP 1 sett: 469,09

Referanser:

1. Stamaril SPC. 01.01.2025

2. FHI. Gulfebervaksine – håndbok for helsepersonell. Tilgjengelig: <https://www.fhi.no/va/vaksinasjonshandboka/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/gulfebervaksinasjon/>

