

# Vandetanib (Caprelsa)



## Einnahmeplan und Patiententagebuch zur sicheren Anwendung von Caprelsa bei Kindern und Jugendlichen mit einer Körperoberfläche von **0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup>**

Dieses Schulungsmaterial wurde als risikominimierende Maßnahme beauftragt und mit dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) abgestimmt. Es soll sicherstellen, dass pädiatrische Patienten und deren Eltern die besonderen Sicherheitsanforderungen von Vandetanib kennen und die speziellen Einnahmepläne berücksichtigen.



## Patient

Name, Vorname

Name, Vorname der Eltern

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

Datum Therapiebeginn mit Caprelsa

## Behandelnder Arzt

Name

Krankenhaus/Praxis

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

Notfallnummer

Caprelsa sind Tabletten zur Behandlung von Kindern (ab 5 Jahren), Jugendlichen und Erwachsenen mit einem aggressiven und symptomatischen medullären Schilddrüsenkrebs (MTC), der eine Rearranged during Transfection (RET)-Mutation aufweist und nicht operabel, lokal fortgeschritten oder metastasiert ist.

## Dosierung

Die Dosierung bei Kindern und Jugendlichen hängt von Körpergewicht und Körpergröße ab. Die benötigte Dosis wird vom behandelnden Arzt festgelegt, basierend auf der von ihm errechneten Körperoberfläche des Patienten.

Es gibt bis zu 3 verschiedene Dosierungsschemata pro Körperoberfläche. Das vom Arzt festgelegte und angekreuzte Schema kann während der Therapie von ihm geändert werden. Die tägliche Gesamtdosis darf jedoch 300 mg nicht übersteigen.

## Hinweise zur Verwendung des Patiententagebuchs

**Bringen Sie dieses Patiententagebuch zu jedem Kontrolltermin mit.** Der Arzt dokumentiert darin im Abschnitt „Ärztliche Verordnung“ von den 2 möglichen Dosierungen die jeweils aktuell für den Patienten gültige Dosis. In dem Abschnitt „Dokumentationsbögen“ soll von Ihnen die Tabletten-Einnahme dokumentiert werden. Bitte achten Sie darauf nur Dokumentationsbögen zu verwenden, die mit der aktuell vom Arzt vorgegebenen Dosierung übereinstimmen. Auf den Seiten 8 und 9 finden Sie ein Beispiel für den korrekten Gebrauch des Patiententagebuchs.

## Mögliche Nebenwirkungen

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Notieren Sie im Dokumentationsbogen Auffälligkeiten und Nebenwirkungen im Feld „Bemerkungen“ und teilen Sie sie Ihrem Arzt mit. Er wird diese beurteilen und an die zuständigen Stellen melden.

Caprelsa kann zu Veränderungen der elektrischen Signalübermittlung am Herzen führen, die zu unregelmäßigen Herzschlägen und lebensbedrohlichen Veränderungen des Herzrhythmus führen können. Ebenso kann es zu einem Gehirnsyndrom kommen, dem sogenannten *posteriores reversiblen Enzephalopathie-Syndrom* (PRES oder RPLS). Auch wurde eine sogenannte interstitielle Lungenerkrankung (ILD) beobachtet.

Um auf diese seltenen, aber möglichen Nebenwirkungen schnellstmöglich zu reagieren bzw. diese zu vermeiden, sollte der behandelnde Arzt umgehend informiert werden, wenn während der Behandlung mit Caprelsa

- Schwindel- oder Ohnmachtsgefühl/Ohnmacht
- unregelmäßiger Herzschlag / „Herzstolpern“
- Kopfschmerzen
- Krampfanfälle/Krämpfe
- Verwirrtheit / Denkschwierigkeiten
- Sehstörungen
- schwerwiegende Atemstörungen, insbesondere plötzlich auftretende, oder sich rasch verschlechternde Atemnot, evtl. in Kombination mit Fieber oder Husten
- Durchfälle

wahrgenommen werden.

Während der Anwendung von Caprelsa kann es zu schweren Hautreaktionen kommen. Informieren Sie Ihren Arzt umgehend, wenn während der Behandlung mit Caprelsa z.B.

- Rötungen
- Geschwüre
- Blasenbildung
- Hautabschilferung
- Brennen auf der Haut

auftreten.

Brechen Sie die Behandlung mit Caprelsa in all diesen Fällen jedoch nicht eigenmächtig ab und ändern Sie die Dosis nicht, es sei denn, auf Anraten des behandelnden Arztes.

Sonnenlicht begünstigt die Entstehung von Hautreaktionen. Daher sollte während der Therapie mit Caprelsa auf einen guten Sonnenschutz geachtet und eine längere Exposition vermieden werden.

## Routinekontrolluntersuchung

Vor und während der gesamten Dauer der Therapie mit Caprelsa, insbesondere aber in den ersten 12 Wochen, ist eine engmaschige Überwachung des Patienten hinsichtlich verschiedener Blutparameter (insbesondere Elektrolyte und Schilddrüsenhormone), sowie der Herzaktionen (EKG) zwingend erforderlich. Dokumentieren Sie in der Tabelle die vereinbarten Untersuchungstermine und markieren Sie das entsprechende Feld, sobald Sie den jeweiligen Termin wahrgenommen haben.

Es können weitere zusätzliche Kontrollen (z.B. bei Durchfall, EKG-Veränderungen, etc.) erforderlich werden.

Routinekontrolltermin	Datum und Uhrzeit	Termin wahrgenommen
Vor Therapiebeginn	um	<input type="checkbox"/> am
nach Therapiewoche 1	um	<input type="checkbox"/> am
nach Therapiewoche 3	um	<input type="checkbox"/> am
nach Therapiewoche 6	um	<input type="checkbox"/> am
nach Therapiewoche 12	um	<input type="checkbox"/> am
nach Therapiemonat 6	um	<input type="checkbox"/> am
nach Therapiemonat 9	um	<input type="checkbox"/> am
nach Therapiemonat 12	um	<input type="checkbox"/> am
	um	<input type="checkbox"/> am
	um	<input type="checkbox"/> am
	um	<input type="checkbox"/> am
	um	<input type="checkbox"/> am

## Routinekontrolluntersuchung nach Dosisanpassung

Nach Dosisänderungen oder Therapiepausen länger als 2 Wochen muss erneut die 12-wöchige, besonders engmaschige Überwachung erfolgen.

Dokumentieren Sie in der Tabelle die vereinbarten Untersuchungstermine und markieren Sie das entsprechende Feld, sobald Sie den jeweiligen Termin wahrgenommen haben.

Es können weitere zusätzliche Kontrollen (z.B. bei Durchfall, EKG-Veränderungen, etc.) erforderlich werden.

Routinekontrolltermin	Datum und Uhrzeit	Termin wahrgenommen
Bei Anpassung/Wiederaufnahme	um	<input type="checkbox"/> am
nach Therapiewoche 1	um	<input type="checkbox"/> am
nach Therapiewoche 3	um	<input type="checkbox"/> am
nach Therapiewoche 6	um	<input type="checkbox"/> am
nach Therapiewoche 12	um	<input type="checkbox"/> am
nach Therapiemonat 6	um	<input type="checkbox"/> am
nach Therapiemonat 9	um	<input type="checkbox"/> am
nach Therapiemonat 12	um	<input type="checkbox"/> am
	um	<input type="checkbox"/> am
	um	<input type="checkbox"/> am
	um	<input type="checkbox"/> am
	um	<input type="checkbox"/> am

## Routinekontrolluntersuchung nach Dosisanpassung

Nach Dosisänderungen oder Therapiepausen länger als 2 Wochen muss erneut die 12-wöchige, besonders engmaschige Überwachung erfolgen.

Dokumentieren Sie in der Tabelle die vereinbarten Untersuchungstermine und markieren Sie das entsprechende Feld, sobald Sie den jeweiligen Termin wahrgenommen haben.

Es können weitere zusätzliche Kontrollen (z.B. bei Durchfall, EKG-Veränderungen, etc.) erforderlich werden.

Routinekontrolltermin	Datum und Uhrzeit	Termin wahrgenommen
Bei Anpassung/Wiederaufnahme	um	<input type="checkbox"/> am
nach Therapiewoche 1	um	<input type="checkbox"/> am
nach Therapiewoche 3	um	<input type="checkbox"/> am
nach Therapiewoche 6	um	<input type="checkbox"/> am
nach Therapiewoche 12	um	<input type="checkbox"/> am
nach Therapiemonat 6	um	<input type="checkbox"/> am
nach Therapiemonat 9	um	<input type="checkbox"/> am
nach Therapiemonat 12	um	<input type="checkbox"/> am
	um	<input type="checkbox"/> am
	um	<input type="checkbox"/> am
	um	<input type="checkbox"/> am
	um	<input type="checkbox"/> am

# Ärztliche Verordnung

Aktuelle Größe des Patienten

**96** cm

Aktuelles Gewicht des Patienten

**25** kg

Berechnete aktuelle Körperoberfläche des Patienten

**0,82** m<sup>2</sup>

Dieses Therapietagebuch ist zur Verwendung bei Patienten mit einer Körperoberfläche von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup>

Diese Anordnung gilt vom

**04.07.2016** bis **01.08.2016**

Datum


**30.06.2016**

Unterschrift des Arztes


*Dr. M. Mustermann*

Vom Arzt gewählte Dosierung

## Übersicht Einnahmeplan

 <b>Anfangs-</b> <b>dosis<sup>a</sup></b>	Tag													
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO
	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg

**Verwenden Sie den Dokumentationsbogen – Anfangsdosis**

 <b>Erhöhte</b> <b>Dosis<sup>b</sup></b>	Tag													
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO
	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg

Nicht zutreffendes durchstreichen

**Verwenden Sie den Dokumentationsbogen – Erhöhte Dosis**

a Die Anfangsdosis ist die Dosierung, mit der die Therapie begonnen werden sollte. Wenn die *Anfangsdosis* für eine Dauer von 8 Wochen gut vertragen wird, kann die erhöhte Dosis in Betracht gezogen werden. Patienten mit Anfangsdosis mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *reduzierten Dosis* wieder aufgenommen werden.

b Dosierungen über 150 mg/m<sup>2</sup> wurden in den klinischen Studien mit Kindern und Jugendlichen nicht untersucht. Patienten mit *erhöhter Dosis* mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *Anfangsdosis* wieder aufgenommen werden.



## Verwendung des Dokumentationsbogens - Beispiel Anfangsdosis

## Dokumentationsbogen - Anfangsdosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Anfangsdosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

## Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.

Verordnung vom	Beginn der Einnahme
<input type="text" value="30.06.2016"/>	<input type="text" value="04.07.2016"/>

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<b>Woche 1</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum <i>04.7.2016</i>		<input checked="" type="checkbox"/> eingenommen		<input checked="" type="checkbox"/> eingenommen		<input checked="" type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 2</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum <i>11.7.2016</i>	<input checked="" type="checkbox"/> eingenommen		<input checked="" type="checkbox"/> eingenommen		<input checked="" type="checkbox"/> eingenommen		<input checked="" type="checkbox"/> eingenommen
<b>Woche 3</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum <i>18.7.2016</i>		<input checked="" type="checkbox"/> eingenommen		<input checked="" type="checkbox"/> eingenommen		<input checked="" type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 4</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum <i>25.7.2016</i>	<input checked="" type="checkbox"/> eingenommen		<input checked="" type="checkbox"/> eingenommen		<input checked="" type="checkbox"/> eingenommen		<input checked="" type="checkbox"/> eingenommen

## Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme
<i>19.7.2016</i>	<i>abends Kopfschmerzen</i>	<i>1 Paracetamol-Zäpfchen (250 mg) gegeben</i>
<i>21.7.2016</i>	<i>Rötungen auf der Haut (linker Arm)</i>	<i>Arzt angerufen</i>
<i>26.7.2016</i>	<i>Fälschlicherweise eine 100 mg Tablette eingenommen</i>	<i>Arzt angerufen</i>

# Ärztliche Verordnung

Aktuelle Größe des Patienten

 cm

Aktuelles Gewicht des Patienten

 kg

Berechnete aktuelle Körperoberfläche des Patienten

 m<sup>2</sup>

Dieses Therapietagebuch ist zur Verwendung bei Patienten mit einer Körperoberfläche von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup>

Diese Anordnung gilt vom


 bis 

Datum


Unterschrift des Arztes

Vom Arzt gewählte Dosierung

## Übersicht Einnahmeplan

 <b>Anfangs-</b> <b>dosis<sup>a</sup></b>	Tag														
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	
	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Anfangsdosis*

 <b>Erhöhte</b> <b>Dosis<sup>b</sup></b>	Tag														
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	
	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Erhöhte Dosis*

- a Die Anfangsdosis ist die Dosierung, mit der die Therapie begonnen werden sollte. Wenn die *Anfangsdosis* für eine Dauer von 8 Wochen gut vertragen wird, kann die erhöhte Dosis in Betracht gezogen werden. Patienten mit Anfangsdosis mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *reduzierten Dosis* wieder aufgenommen werden.
- b Dosierungen über 150 mg/m<sup>2</sup> wurden in den klinischen Studien mit Kindern und Jugendlichen nicht untersucht. Patienten mit *erhöhter Dosis* mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *Anfangsdosis* wieder aufgenommen werden.

# Ärztliche Verordnung

Aktuelle Größe des Patienten

 cm

Aktuelles Gewicht des Patienten

 kg

Berechnete aktuelle Körperoberfläche des Patienten

 m<sup>2</sup>

Dieses Therapietagebuch ist zur Verwendung bei Patienten mit einer Körperoberfläche von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup>

Diese Anordnung gilt vom


 bis 

Datum


Unterschrift des Arztes

Vom Arzt gewählte Dosierung

## Übersicht Einnahmeplan

 <b>Anfangs-</b> <b>dosis<sup>a</sup></b>	Tag														
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	
	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Anfangsdosis*

 <b>Erhöhte</b> <b>Dosis<sup>b</sup></b>	Tag														
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	
	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Erhöhte Dosis*

- a Die Anfangsdosis ist die Dosierung, mit der die Therapie begonnen werden sollte. Wenn die *Anfangsdosis* für eine Dauer von 8 Wochen gut vertragen wird, kann die erhöhte Dosis in Betracht gezogen werden. Patienten mit Anfangsdosis mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *reduzierten Dosis* wieder aufgenommen werden.
- b Dosierungen über 150 mg/m<sup>2</sup> wurden in den klinischen Studien mit Kindern und Jugendlichen nicht untersucht. Patienten mit *erhöhter Dosis* mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *Anfangsdosis* wieder aufgenommen werden.

# Ärztliche Verordnung

Aktuelle Größe des Patienten

 cm

Aktuelles Gewicht des Patienten

 kg

Berechnete aktuelle Körperoberfläche des Patienten

 m<sup>2</sup>

Dieses Therapietagebuch ist zur Verwendung bei Patienten mit einer Körperoberfläche von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup>

Diese Anordnung gilt vom


 bis 

Datum


Unterschrift des Arztes

Vom Arzt gewählte Dosierung

## Übersicht Einnahmeplan

 <b>Anfangs-</b> <b>dosis<sup>a</sup></b>	Tag													
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO
	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Anfangsdosis*

 <b>Erhöhte</b> <b>Dosis<sup>b</sup></b>	Tag													
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO
	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Erhöhte Dosis*

- a Die Anfangsdosis ist die Dosierung, mit der die Therapie begonnen werden sollte. Wenn die *Anfangsdosis* für eine Dauer von 8 Wochen gut vertragen wird, kann die erhöhte Dosis in Betracht gezogen werden. Patienten mit Anfangsdosis mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *reduzierten Dosis* wieder aufgenommen werden.
- b Dosierungen über 150 mg/m<sup>2</sup> wurden in den klinischen Studien mit Kindern und Jugendlichen nicht untersucht. Patienten mit *erhöhter Dosis* mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *Anfangsdosis* wieder aufgenommen werden.

# Ärztliche Verordnung

Aktuelle Größe des Patienten

 cm

Aktuelles Gewicht des Patienten

 kg

Berechnete aktuelle Körperoberfläche des Patienten

 m<sup>2</sup>

Dieses Therapietagebuch ist zur Verwendung bei Patienten mit einer Körperoberfläche von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup>

Diese Anordnung gilt vom


 bis 

Datum


Unterschrift des Arztes

Vom Arzt gewählte Dosierung

## Übersicht Einnahmeplan

 <b>Anfangs-</b> <b>dosis<sup>a</sup></b>	Tag														
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	
	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Anfangsdosis*

 <b>Erhöhte</b> <b>Dosis<sup>b</sup></b>	Tag														
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	
	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Erhöhte Dosis*

a Die Anfangsdosis ist die Dosierung, mit der die Therapie begonnen werden sollte. Wenn die *Anfangsdosis* für eine Dauer von 8 Wochen gut vertragen wird, kann die erhöhte Dosis in Betracht gezogen werden. Patienten mit Anfangsdosis mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *reduzierten Dosis* wieder aufgenommen werden.

b Dosierungen über 150 mg/m<sup>2</sup> wurden in den klinischen Studien mit Kindern und Jugendlichen nicht untersucht. Patienten mit *erhöhter Dosis* mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *Anfangsdosis* wieder aufgenommen werden.

# Ärztliche Verordnung

Aktuelle Größe des Patienten

 cm

Aktuelles Gewicht des Patienten

 kg

Berechnete aktuelle Körperoberfläche des Patienten

 m<sup>2</sup>

Dieses Therapietagebuch ist zur Verwendung bei Patienten mit einer Körperoberfläche von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup>

Diese Anordnung gilt vom

 bis 

Datum

Unterschrift des Arztes

Vom Arzt gewählte Dosierung

## Übersicht Einnahmeplan

Anfangs-dosis <sup>a</sup>	Tag													
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO
	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Anfangsdosis*

Erhöhte Dosis <sup>b</sup>	Tag													
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO
	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Erhöhte Dosis*

- a Die Anfangsdosis ist die Dosierung, mit der die Therapie begonnen werden sollte. Wenn die *Anfangsdosis* für eine Dauer von 8 Wochen gut vertragen wird, kann die erhöhte Dosis in Betracht gezogen werden. Patienten mit Anfangsdosis mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *reduzierten Dosis* wieder aufgenommen werden.
- b Dosierungen über 150 mg/m<sup>2</sup> wurden in den klinischen Studien mit Kindern und Jugendlichen nicht untersucht. Patienten mit *erhöhter Dosis* mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *Anfangsdosis* wieder aufgenommen werden.

# Ärztliche Verordnung

Aktuelle Größe des Patienten

 cm

Aktuelles Gewicht des Patienten

 kg

Berechnete aktuelle Körperoberfläche des Patienten

 m<sup>2</sup>

Dieses Therapietagebuch ist zur Verwendung bei Patienten mit einer Körperoberfläche von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup>

Diese Anordnung gilt vom


 bis 

Datum


Unterschrift des Arztes

Vom Arzt gewählte Dosierung

## Übersicht Einnahmeplan

 <b>Anfangs-</b> <b>dosis<sup>a</sup></b>	Tag														
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	
	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Anfangsdosis*

 <b>Erhöhte</b> <b>Dosis<sup>b</sup></b>	Tag														
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	
	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Erhöhte Dosis*

- a Die Anfangsdosis ist die Dosierung, mit der die Therapie begonnen werden sollte. Wenn die *Anfangsdosis* für eine Dauer von 8 Wochen gut vertragen wird, kann die erhöhte Dosis in Betracht gezogen werden. Patienten mit Anfangsdosis mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *reduzierten Dosis* wieder aufgenommen werden.
- b Dosierungen über 150 mg/m<sup>2</sup> wurden in den klinischen Studien mit Kindern und Jugendlichen nicht untersucht. Patienten mit *erhöhter Dosis* mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *Anfangsdosis* wieder aufgenommen werden.

# Ärztliche Verordnung

Aktuelle Größe des Patienten

 cm

Aktuelles Gewicht des Patienten

 kg

Berechnete aktuelle Körperoberfläche des Patienten

 m<sup>2</sup>

Dieses Therapietagebuch ist zur Verwendung bei Patienten mit einer Körperoberfläche von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup>

Diese Anordnung gilt vom

 bis 

Datum

Unterschrift des Arztes

Vom Arzt gewählte Dosierung

## Übersicht Einnahmeplan

Anfangs-dosis <sup>a</sup>	Tag													
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO
	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Anfangsdosis*

Erhöhte Dosis <sup>b</sup>	Tag													
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO
	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Erhöhte Dosis*

a Die Anfangsdosis ist die Dosierung, mit der die Therapie begonnen werden sollte. Wenn die *Anfangsdosis* für eine Dauer von 8 Wochen gut vertragen wird, kann die erhöhte Dosis in Betracht gezogen werden. Patienten mit Anfangsdosis mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *reduzierten Dosis* wieder aufgenommen werden.

b Dosierungen über 150 mg/m<sup>2</sup> wurden in den klinischen Studien mit Kindern und Jugendlichen nicht untersucht. Patienten mit *erhöhter Dosis* mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *Anfangsdosis* wieder aufgenommen werden.



# Ärztliche Verordnung

Aktuelle Größe des Patienten

 cm

Aktuelles Gewicht des Patienten

 kg

Berechnete aktuelle Körperoberfläche des Patienten

 m<sup>2</sup>

Dieses Therapietagebuch ist zur Verwendung bei Patienten mit einer Körperoberfläche von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup>

Diese Anordnung gilt vom


 bis 

Datum


Unterschrift des Arztes

Vom Arzt gewählte Dosierung

## Übersicht Einnahmeplan

 <b>Anfangs-</b> <b>dosis<sup>a</sup></b>	Tag														
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	
	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Anfangsdosis*

 <b>Erhöhte</b> <b>Dosis<sup>b</sup></b>	Tag														
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	
	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Erhöhte Dosis*

- a Die Anfangsdosis ist die Dosierung, mit der die Therapie begonnen werden sollte. Wenn die *Anfangsdosis* für eine Dauer von 8 Wochen gut vertragen wird, kann die erhöhte Dosis in Betracht gezogen werden. Patienten mit Anfangsdosis mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *reduzierten Dosis* wieder aufgenommen werden.
- b Dosierungen über 150 mg/m<sup>2</sup> wurden in den klinischen Studien mit Kindern und Jugendlichen nicht untersucht. Patienten mit *erhöhter Dosis* mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *Anfangsdosis* wieder aufgenommen werden.

# Ärztliche Verordnung

Aktuelle Größe des Patienten

 cm

Aktuelles Gewicht des Patienten

 kg

Berechnete aktuelle Körperoberfläche des Patienten

 m<sup>2</sup>

Dieses Therapietagebuch ist zur Verwendung bei Patienten mit einer Körperoberfläche von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup>

Diese Anordnung gilt vom


 bis 

Datum


Unterschrift des Arztes

Vom Arzt gewählte Dosierung

## Übersicht Einnahmeplan

 <b>Anfangs-</b> <b>dosis<sup>a</sup></b>	Tag														
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	
	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Anfangsdosis*

 <b>Erhöhte</b> <b>Dosis<sup>b</sup></b>	Tag														
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	
	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Erhöhte Dosis*

- a Die Anfangsdosis ist die Dosierung, mit der die Therapie begonnen werden sollte. Wenn die *Anfangsdosis* für eine Dauer von 8 Wochen gut vertragen wird, kann die erhöhte Dosis in Betracht gezogen werden. Patienten mit Anfangsdosis mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *reduzierten Dosis* wieder aufgenommen werden.
- b Dosierungen über 150 mg/m<sup>2</sup> wurden in den klinischen Studien mit Kindern und Jugendlichen nicht untersucht. Patienten mit *erhöhter Dosis* mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *Anfangsdosis* wieder aufgenommen werden.

# Ärztliche Verordnung

Aktuelle Größe des Patienten

 cm

Aktuelles Gewicht des Patienten

 kg

Berechnete aktuelle Körperoberfläche des Patienten

 m<sup>2</sup>

Dieses Therapietagebuch ist zur Verwendung bei Patienten mit einer Körperoberfläche von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup>

Diese Anordnung gilt vom


 bis 

Datum


Unterschrift des Arztes

Vom Arzt gewählte Dosierung

## Übersicht Einnahmeplan

 <b>Anfangs-</b> <b>dosis<sup>a</sup></b>	Tag														
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	
	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Anfangsdosis*

 <b>Erhöhte</b> <b>Dosis<sup>b</sup></b>	Tag														
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	
	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Erhöhte Dosis*

- a Die Anfangsdosis ist die Dosierung, mit der die Therapie begonnen werden sollte. Wenn die *Anfangsdosis* für eine Dauer von 8 Wochen gut vertragen wird, kann die erhöhte Dosis in Betracht gezogen werden. Patienten mit Anfangsdosis mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *reduzierten Dosis* wieder aufgenommen werden.
- b Dosierungen über 150 mg/m<sup>2</sup> wurden in den klinischen Studien mit Kindern und Jugendlichen nicht untersucht. Patienten mit *erhöhter Dosis* mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *Anfangsdosis* wieder aufgenommen werden.

# Ärztliche Verordnung

Aktuelle Größe des Patienten

 cm

Aktuelles Gewicht des Patienten

 kg

Berechnete aktuelle Körperoberfläche des Patienten

 m<sup>2</sup>

Dieses Therapietagebuch ist zur Verwendung bei Patienten mit einer Körperoberfläche von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup>

Diese Anordnung gilt vom

 bis 

Datum

Unterschrift des Arztes

Vom Arzt gewählte Dosierung

## Übersicht Einnahmeplan

Anfangs-dosis <sup>a</sup>	Tag													
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO
	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Anfangsdosis*

Erhöhte Dosis <sup>b</sup>	Tag													
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO
	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Erhöhte Dosis*

- a Die Anfangsdosis ist die Dosierung, mit der die Therapie begonnen werden sollte. Wenn die *Anfangsdosis* für eine Dauer von 8 Wochen gut vertragen wird, kann die erhöhte Dosis in Betracht gezogen werden. Patienten mit Anfangsdosis mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *reduzierten Dosis* wieder aufgenommen werden.
- b Dosierungen über 150 mg/m<sup>2</sup> wurden in den klinischen Studien mit Kindern und Jugendlichen nicht untersucht. Patienten mit *erhöhter Dosis* mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *Anfangsdosis* wieder aufgenommen werden.

# Ärztliche Verordnung

Aktuelle Größe des Patienten

 cm

Aktuelles Gewicht des Patienten

 kg

Berechnete aktuelle Körperoberfläche des Patienten

 m<sup>2</sup>

Dieses Therapietagebuch ist zur Verwendung bei Patienten mit einer Körperoberfläche von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2a</sup>

Diese Anordnung gilt vom


 bis 

Datum


Unterschrift des Arztes

Vom Arzt gewählte Dosierung

## Übersicht Einnahmeplan

 <b>Anfangs-</b> <b>dosis<sup>a</sup></b>	Tag														
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	
	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Anfangsdosis*

 <b>Erhöhte</b> <b>Dosis<sup>b</sup></b>	Tag														
	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	Mo	DI	MI	DO	FR	SA	SO	
	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg

Verwenden Sie den *Dokumentationsbogen – Erhöhte Dosis*

- a Die Anfangsdosis ist die Dosierung, mit der die Therapie begonnen werden sollte. Wenn die *Anfangsdosis* für eine Dauer von 8 Wochen gut vertragen wird, kann die erhöhte Dosis in Betracht gezogen werden. Patienten mit Anfangsdosis mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *reduzierten Dosis* wieder aufgenommen werden.
- b Dosierungen über 150 mg/m<sup>2</sup> wurden in den klinischen Studien mit Kindern und Jugendlichen nicht untersucht. Patienten mit *erhöhter Dosis* mit einer Nebenwirkung, die eine Dosisreduktion erforderlich macht, sollten die Einnahme von Vandetanib für mindestens eine Woche unterbrechen. Nach vollständiger Erholung von der Nebenwirkung kann die Einnahme danach mit der *Anfangsdosis* wieder aufgenommen werden.

# Dokumentationsbogen - Anfangsdosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Anfangsdosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

## Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.

Verordnung vom	Beginn der Einnahme

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<b>Woche 1</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 2</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen
<b>Woche 3</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 4</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme

## Dokumentationsbogen - Anfangsdosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Anfangsdosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

### Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.

Verordnung vom	Beginn der Einnahme
<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<b>Woche 1</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 2</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen
<b>Woche 3</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 4</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme

# Dokumentationsbogen - Anfangsdosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Anfangsdosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

## Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.

Verordnung vom	Beginn der Einnahme

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<b>Woche 1</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 2</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen
<b>Woche 3</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 4</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme



## Dokumentationsbogen - Anfangsdosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Anfangsdosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

### Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.

Verordnung vom	Beginn der Einnahme
<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<b>Woche 1</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 2</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen
<b>Woche 3</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 4</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme

# Dokumentationsbogen - Anfangsdosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Anfangsdosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

## Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.

Verordnung vom	Beginn der Einnahme

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<b>Woche 1</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 2</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen
<b>Woche 3</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 4</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme

## Dokumentationsbogen - Anfangsdosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Anfangsdosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

**Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.**

Verordnung vom	Beginn der Einnahme
<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<b>Woche 1</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 2</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen
<b>Woche 3</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 4</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme

# Dokumentationsbogen - Anfangsdosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Anfangsdosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

## Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.

Verordnung vom	Beginn der Einnahme

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<b>Woche 1</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 2</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen
<b>Woche 3</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 4</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme

## Dokumentationsbogen - Anfangsdosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Anfangsdosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

**Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.**

Verordnung vom	Beginn der Einnahme
<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<b>Woche 1</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 2</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen
<b>Woche 3</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 4</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme

# Dokumentationsbogen - Anfangsdosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Anfangsdosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

## Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.

Verordnung vom	Beginn der Einnahme

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<b>Woche 1</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 2</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen
<b>Woche 3</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 4</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme

## Dokumentationsbogen - Anfangsdosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Anfangsdosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

### Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.

Verordnung vom	Beginn der Einnahme
<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<b>Woche 1</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 2</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen
<b>Woche 3</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 4</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme

# Dokumentationsbogen - Anfangsdosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Anfangsdosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

## Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.

Verordnung vom	Beginn der Einnahme

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<b>Woche 1</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 2</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen
<b>Woche 3</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 4</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme



## Dokumentationsbogen - Anfangsdosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Anfangsdosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

**Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.**

Verordnung vom	Beginn der Einnahme
<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<b>Woche 1</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 2</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen
<b>Woche 3</b>	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-
Datum		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen	
<b>Woche 4</b>	100 mg	-	100 mg	-	100 mg	-	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen		<input type="checkbox"/> eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme

# Dokumentationsbogen - Erhöhte Dosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Erhöhte Dosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

## Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.

Verordnung vom	Beginn der Einnahme
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Woche 1	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
Woche 2	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
Woche 3	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
Woche 4	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme

## Dokumentationsbogen - Erhöhte Dosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Erhöhte Dosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

**Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.**

Verordnung vom	Beginn der Einnahme
<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<b>Woche 1</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
<b>Woche 2</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
<b>Woche 3</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
<b>Woche 4</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme

# Dokumentationsbogen - Erhöhte Dosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Erhöhte Dosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

## Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.

Verordnung vom	Beginn der Einnahme

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<b>Woche 1</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
<b>Woche 2</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
<b>Woche 3</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
<b>Woche 4</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme

## Dokumentationsbogen - Erhöhte Dosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Erhöhte Dosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

**Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.**

Verordnung vom	Beginn der Einnahme
<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<b>Woche 1</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
<b>Woche 2</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
<b>Woche 3</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
<b>Woche 4</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme

## Dokumentationsbogen - Erhöhte Dosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Erhöhte Dosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

**Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.**

Verordnung vom	Beginn der Einnahme
<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Woche 1	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
Woche 2	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
Woche 3	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
Woche 4	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme

## Dokumentationsbogen - Erhöhte Dosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Erhöhte Dosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

**Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.**

Verordnung vom	Beginn der Einnahme
<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<b>Woche 1</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
<b>Woche 2</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
<b>Woche 3</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
<b>Woche 4</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme

# Dokumentationsbogen - Erhöhte Dosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Erhöhte Dosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

## Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.

Verordnung vom	Beginn der Einnahme

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Woche 1	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
Woche 2	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
Woche 3	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
Woche 4	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme



## Dokumentationsbogen - Erhöhte Dosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚**Erhöhte Dosis**‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

**Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.**

Verordnung vom	Beginn der Einnahme
<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<b>Woche 1</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
<b>Woche 2</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
<b>Woche 3</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
<b>Woche 4</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme

## Dokumentationsbogen - Erhöhte Dosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Erhöhte Dosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

**Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.**

Verordnung vom	Beginn der Einnahme
<input style="width: 95%; height: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 95%; height: 100%;" type="text"/>

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Woche 1	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
Woche 2	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
Woche 3	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
Woche 4	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme

## Dokumentationsbogen - Erhöhte Dosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Erhöhte Dosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

**Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.**

Verordnung vom	Beginn der Einnahme
<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<b>Woche 1</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
<b>Woche 2</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
<b>Woche 3</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
<b>Woche 4</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme

## Dokumentationsbogen - Erhöhte Dosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Erhöhte Dosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

**Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.**

Verordnung vom	Beginn der Einnahme

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
Woche 1	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
Woche 2	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
Woche 3	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
Woche 4	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme

## Dokumentationsbogen - Erhöhte Dosis

Verwenden Sie diesen Dokumentationsbogen, wenn der Arzt das Feld ‚Erhöhte Dosis‘ in der Verordnung für den aktuellen Therapiezeitraum markiert hat und die Körperoberfläche des Patienten von 0,7 m<sup>2</sup> bis <0,9 m<sup>2</sup> beträgt. Dokumentieren Sie die entsprechende Einnahme jeweils unmittelbar danach, indem Sie das Feld ‚ eingenommen‘ ankreuzen.

Die Einnahme der täglich verordneten Dosis sollte auf einmal, möglichst immer zur gleichen Tageszeit erfolgen. Dabei muss *kein* Abstand zu den Mahlzeiten eingehalten werden.

Sollte eine Einnahme vergessen worden sein, sollte sie nachgeholt werden, sobald dies bemerkt wird. **Wenn der Zeitraum bis zur nächsten Dosis weniger als 12 Stunden beträgt, sollte der Patient die ausgelassene Dosis nicht einnehmen. Keinesfalls sollten Patienten die doppelte Dosis (zwei Dosen zur selben Zeit) einnehmen, um eine vergessene Dosis nachzuholen.**

Die am häufigsten unter der Anwendung von Caprelsa berichteten Nebenwirkungen sind Durchfall, Hautausschlag, Übelkeit, Hypertonie (hoher Blutdruck) und Kopfschmerzen. Eine vollständige Auflistung der bekannten Nebenwirkungen von Caprelsa finden Sie in der Packungsbeilage. Notieren Sie Nebenwirkungen und Auffälligkeiten unter „Bemerkungen“.

**Kontaktieren Sie bei Problemen oder Unklarheiten den behandelnden Arzt.**

Verordnung vom	Beginn der Einnahme
<input type="text"/>	<input type="text"/>

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
<b>Woche 1</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
<b>Woche 2</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
<b>Woche 3</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen
<b>Woche 4</b>	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg	100 mg
Datum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen	eingenommen

### Bemerkungen:

Datum	Symptom/Bemerkung	Maßnahme

## Meldung von Nebenwirkungen

Die Meldung von Nebenwirkungen ist von großer Wichtigkeit für eine kontinuierliche Überwachung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses von Arzneimitteln. Bitte melden Sie Nebenwirkungen dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, Traisengasse 5, 1200 Wien, Österreich, Fax: +43 (0) 50555 36207, <https://www.basg.gv.at> oder dem pharmazeutischen Unternehmen (siehe Kontaktdaten unten).

Alle Schulungsmaterialien zu Vandetanib (Leitfaden zur Verringerung von Arzneimittel- und Anwendungsrisiken - Ärzte und Ärztinnen, Dosierungsempfehlung für Ärzte für die Anwendung von Caprelsa bei Kindern und Jugendlichen, Patientenpass, Einnahmepläne und Patiententagebücher zur sicheren Anwendung von Caprelsa bei Kindern und Jugendlichen) sind auch online über <https://www.campus.sanofi.at/services/risikomanagementplaene> verfügbar. Gedruckte Exemplare können Sie beim pharmazeutischen Unternehmen bestellen.



Sanofi-Aventis GmbH  
medinfo.de@sanofi.com  
Tel.: +43 (0) 180185 2244

Stand Mai 2024



348511