

Telefonnummer des behandelnden Arztes

Name des behandelnden Arztes

Name des Behandlungszentrums

Metabolisierungsstatus bzgl. CYP2D6

Datum der Erstverordnung von Eliglustat

Name des Patienten

PATIENTENKARTE ZUR SICHEREN ANWENDUNG

Informationen für den Patienten

Wenden Sie sich immer an den Arzt,
der Eliglustat verschrieben hat, bevor
Sie eine Behandlung mit anderen
Arzneimitteln beginnen.

Verzehren Sie keine Grapefruit-Produkte.



sanofi

Informationen für medizinisches Fachpersonal

Dieser Patient nimmt Eliglustat zur Behandlung des Morbus Gaucher Typ 1 (GD1) ein.

Eliglustat sollte nicht gleichzeitig mit Arzneimitteln eingenommen werden, die einen Einfluss auf die Leberenzyme haben könnten, die eine Rolle im Eliglustat-Stoffwechsel spielen.

Die Verwendung von Eliglustat zusammen mit CYP2D6- oder CYP3A4-**Inhibitoren** kann zu einer Erhöhung der Plasmakonzentration von Eliglustat führen. Bei erheblich erhöhten Plasmaspiegeln sind geringfügige EKG-Veränderungen möglich.

Bei gleichzeitiger Einnahme von Eliglustat mit P-Glykoprotein (P-gp)- oder CYP2D6-**Substraten** kann die Plasmakonzentration dieser Wirkstoffe erhöht werden.

Die Einnahme von CYP3A4-**Induktoren** kann zur Verringerung der Wirksamkeit von Eliglustat führen.

Bei Patienten mit Leber- oder Nierenfunktionsstörungen ist zu beachten, dass es zu höheren Eliglustatspiegeln kommen kann. Dem entsprechend ist für einige Patientengruppen z.T. bei Kombination mit anderen Arzneimitteln die Dosis anzupassen, bzw. ist Eliglustat kontraindiziert oder wird nicht empfohlen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Fachinformation