

AVAXIM^{MD} – Vaccin inactivé contre l'hépatite A

Demandez à votre fournisseur de services de santé si ce vaccin vous convient.

AVAXIM^{MD}

Vaccin inactivé contre l'hépatite A

Qu'est-ce que l'hépatite A?

L'hépatite A est une infection du foie, causée par un virus, qui est très répandue dans les pays en voie de développement. Cette infection est caractérisée par une jaunisse (coloration jaune de la peau). Les symptômes comprennent de la fatigue, des nausées et une faiblesse générale qui peut durer un mois ou plus. Les jeunes enfants peuvent ne présenter aucun symptôme, mais ils peuvent tout de même transmettre la maladie à d'autres. Cette maladie est rarement fatale, mais environ 25 % des cas signalés chez les adultes nécessitent une hospitalisation.

Comment l'hépatite A est-elle transmise?

Vous pouvez contracter cette maladie en consommant de l'eau ou des aliments contaminés. Le virus peut aussi se transmettre par contact avec une personne infectée.

Comment puis-je me protéger?

La vaccination par AVAXIM^{MD} réduit les risques de contracter l'hépatite A chez les personnes âgées de 12 ans ou plus.

Vous recevrez une injection dans le muscle de l'épaule. Pour une protection à long terme, une deuxième injection est nécessaire dans les six à trente-six mois suivant la première injection.

La plupart des personnes qui reçoivent le vaccin AVAXIM^{MD} produiront suffisamment d'anticorps pour les aider à se protéger contre l'hépatite A. Toutefois, comme c'est le cas de tous les vaccins, une protection à 100 % ne peut pas être garantie.


Il est possible que les personnes dont le système immunitaire est affaibli, du fait d'une maladie ou d'un traitement, n'obtiennent pas la protection attendue de la part du vaccin.

La vaccination est une mesure de prévention importante contre l'hépatite A, mais on recommande malgré tout aux voyageurs d'éviter les aliments et les boissons qui ont un risque d'être contaminés.

Consultez votre fournisseur de services de santé pour connaître les façons dont vous pouvez vous protéger de l'exposition aux maladies transmises par la consommation d'eau et d'aliments contaminés. (Cela comprend les cubes de glace et l'eau utilisée pour l'hygiène personnelle, p. ex. pour se brosser les dents.) Il n'existe que peu de données concernant les patients âgés de 65 ans et plus.

Qui devrait recevoir le vaccin?

Toutes les personnes qui voyagent dans des régions à risque d'hépatite A devraient envisager la vaccination par AVAXIM^{MD}. Le vaccin n'est pas destiné au traitement de l'hépatite A.



Qui ne devrait pas recevoir AVAXIM^{MD}?

- Les enfants âgés de moins de douze ans. Veuillez demander à votre fournisseur de soins de santé la meilleure option qui s'offre à ceux qui sont âgés de moins de douze ans.
- Toutes les personnes qui ont une allergie connue au vaccin ou à un de ses composants. Il est nécessaire de faire preuve de vigilance lorsque l'on administre le vaccin à des sujets manifestant une hypersensibilité au formaldéhyde ou à la néomycine (et autres antibiotiques de la même classe).
- Toute personne qui souffre d'une maladie grave ou de fièvre élevée. Attendez

d'être en bonne santé avant de recevoir le vaccin. Une maladie mineure sans fièvre, ou une fièvre légère, telle qu'une légère infection des voies respiratoires supérieures, ne constitue généralement pas une raison valable pour reporter la vaccination.

- La vaccination n'est pas recommandée au cours de la grossesse, sauf s'il y a un risque certain de contracter l'hépatite A. Les femmes enceintes devraient aborder la question des risques et des bienfaits de la vaccination par AVAXIM^{MD} avec leur fournisseur de services de santé.

Y a-t-il des effets secondaires?

Les effets secondaires signalés après la vaccination par AVAXIM^{MD} sont généralement légers et transitoires. La réaction locale la plus fréquente est une légère douleur au point d'injection, parfois accompagnée de rougeur. Certaines personnes peuvent présenter des réactions systémiques telles qu'une fièvre, une faiblesse, des maux de tête, des douleurs musculaires ou articulaires ou des troubles gastro-intestinaux comme de la nausée, des vomissements, de la diarrhée ou une douleur.

Cette liste des effets secondaires n'est pas exhaustive. Vous pouvez consulter votre fournisseur de services de santé pour obtenir une liste plus complète des effets secondaires qui peuvent survenir après la vaccination par AVAXIM^{MD}.

Est-ce que j'aurai besoin d'être vacciné à nouveau par AVAXIM^{MD}?

Pour une protection à long terme, il est recommandé d'obtenir une dose de rappel de six à trente-six mois après la première dose.

AVAXIM^{MD} est un vaccin efficace pour prévenir l'hépatite A. Il n'est pas indiqué dans la réduction des décès, des symptômes et des hospitalisations associés à l'hépatite A.

Remarque : Les zones d'endémie changent au fil du temps. Consultez votre fournisseur de services de santé pour avoir toutes les informations à jour sur les risques de maladie à votre destination.

COORDONNÉES DE LA CLINIQUE :

AVERTISSEMENT : Le présent document vise uniquement à fournir de l'information générale et n'est pas destiné à remplacer, de quelque façon que ce soit, les conseils, les soins médicaux ou les traitements prodigués par un pourvoyeur de soins de santé. Veuillez consulter votre fournisseur de services de santé si vous avez la moindre question. Ce document ne constitue pas un consentement éclairé de votre part à un traitement ou à des soins médicaux, quels qu'ils soient, et ne doit pas être considéré comme tel.