

# TYPHIM Vi<sup>MD</sup> – Vaccin polysaccharidique capsulaire Vi contre *Salmonella typhi*

**TYPHIM Vi<sup>MD</sup>**  
Vaccin polysaccharidique capsulaire Vi contre *Salmonella typhi*

Consultez votre professionnel de santé pour savoir si le vaccin vous convient.

### Qu'est-ce que la fièvre typhoïde?

La fièvre typhoïde est une maladie courante dans les pays en développement qui est associée à un mauvais assainissement et au manque d'eau potable. Il s'agit d'une maladie infectieuse qui se propage par la consommation d'aliments et/ou de boissons contaminés par la bactérie *Salmonella typhi*. Les personnes atteintes de fièvre typhoïde présentent une fièvre soutenue, leur température pouvant monter jusqu'à 39 ou 40 °C (103 ou 104 °F). Les symptômes peuvent également inclure une sensation de faiblesse, des gastralgies, des céphalées ou une perte d'appétit. Chez certains patients, une éruption de taches plates et rosacées peut survenir. La maladie peut mettre la vie en danger.

### Comment la fièvre typhoïde se propage-t-elle?

Vous pouvez tomber malade en consommant des aliments et/ou des boissons contaminés.

### Comment puis-je me protéger?

Le vaccin TYPHIM Vi<sup>MD</sup> réduit le risque d'attraper la fièvre typhoïde. Vous recevrez une seule injection intramusculaire de 0,5 ml.

Afin de vous assurer d'une réponse immunitaire adéquate, vous devriez vous faire vacciner au moins 2 semaines avant votre départ.

La vaccination est une importante mesure de prévention de la fièvre typhoïde, mais elle ne protège pas

à 100 %. Typhim Vi<sup>MD</sup> ne traite pas la fièvre typhoïde. On recommande aux voyageurs de faire preuve de prudence à l'égard des aliments et des boissons. Consultez votre professionnel de santé pour apprendre comment vous protéger contre les maladies transmises par les aliments et l'eau contaminés (y compris par les glaçons ou par l'eau utilisée pour l'hygiène personnelle [p. ex. brossage des dents]).



■ Régions à risque élevé

■ Régions à risque modéré

### Qui devrait être vacciné?

Les personnes âgées de 2 ans et plus voyageant vers une région à risque élevé pour la fièvre typhoïde devraient envisager de recevoir TYPHIM Vi<sup>MD</sup>, particulièrement en cas de séjour prolongé.

### Qui ne devrait pas être vacciné par TYPHIM Vi<sup>MD</sup>?

- Les enfants âgés de moins de 2 ans
- Les personnes ayant une allergie avérée au vaccin ou à l'un de ces composants

### Si l'une des conditions suivantes s'applique à vous, consultez votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien AVANT de recevoir TYPHIM Vi<sup>MD</sup> :

- Forte fièvre ou affection grave
- Système immunitaire affaibli, que ce soit à cause d'une maladie ou d'un traitement
- Troubles de la coagulation ou prise de médicaments anticoagulants
- Grossesse ou allaitement
- Perte de connaissance lors d'une injection précédente
- Une allergie à l'un des composants du vaccin ou de son contenant

### Y a-t-il des effets secondaires?

Les effets secondaires graves sont rares. Certaines personnes qui reçoivent TYPHIM Vi<sup>MD</sup> peuvent avoir des effets secondaires bénins comme une douleur ou une sensibilité au point d'injection associée à une rougeur et à un gonflement. Les autres effets secondaires possibles fréquemment rapportés peuvent comprendre de la fièvre, des céphalées, une sensation générale de faiblesse et d'inconfort, des douleurs musculaires, des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Ces effets secondaires disparaissent habituellement en quelques jours.

Cette liste d'effets secondaires n'est pas exhaustive. Votre professionnel de santé peut discuter avec vous de tous les effets secondaires susceptibles de se manifester après l'administration de TYPHIM Vi<sup>MD</sup>.

### Aurais-je besoin de recevoir TYPHIM Vi<sup>MD</sup> à nouveau?

Il est recommandé de recevoir une dose de rappel 3 ans après la première, si vous envisagez de voyager à nouveau dans une région où la maladie est présente.

REMARQUE: Les régions présentant un risque pour la maladie changent avec le temps. Demandez à votre professionnel de santé les renseignements les plus récents sur les maladies endémiques présentes par votre lieu de destination.

### NOM, ADRESSE ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA CLINIQUE :

**AVERTISSEMENT :** Le présent document vise uniquement à fournir de l'information générale et n'est pas destiné à remplacer, de quelque façon que ce soit, les conseils, soins médicaux ou traitements d'un professionnel de santé. Veuillez consulter votre médecin ou tout autre professionnel de santé si vous avez des questions sur ce document.

Visitez [sanofi.ca](http://sanofi.ca) pour plus d'informations sur Typhim Vi<sup>MD</sup>.

Rien ne peut remplacer la consultation d'un médecin ou autre professionnel de santé. La lecture de ce document ne constitue pas un consentement éclairé de votre part à un traitement ou à des soins médicaux, quels qu'ils soient, et ne doit pas être considérée comme tel.



MAT-CA-2500115 F-v1.0-March 2025. © 2025 Sanofi Pasteur Limitée. TYPHIM Vi<sup>MD</sup> est une marque déposée de Sanofi Pasteur. Consultez votre régime d'assurance privé pour obtenir des informations sur la couverture TYPHIM Vi<sup>MD</sup>. Numéro d'identification du médicament (DIN) : 02130955.

SANOFI - 1755 Steeles Avenue West - Toronto - ON - Canada - M2R 3T4 - Tel: 416.667.2700 - [www.sanofi.ca](http://www.sanofi.ca)