

GUÍA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

PRESENTACIÓN DE SOLIQUA (INSULINA GLARGINA 100 UNIDADES/ml + LIXISENATIDA)
DISPONIBLE EN 2 PLUMAS PRELLENADAS QUE CONTIENEN DIFERENTES
CONCENTRACIONES DE DOSIS.

CHECKLIST PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

EXPLIQUE A SU PACIENTE

- ☐ Usted está recetando una serie de pasos de dosis que corresponden a una cantidad establecida de unidades de insulina glargina 100 U/ml más una cantidad correspondiente de lixisenatida.
- ☐ Para SOLIQUA, un paso de dosis siempre contiene una unidad de insulina glargina de 100 U/ml, independientemente de la pluma prellenada de SOLIQUA que se esté utilizando (la pluma de SOLIQUA [10-40] o la pluma de SOLIQUA [30-60]).
- ☐ El indicador de dosis muestra la cantidad de pasos de dosis que se inyectarán.
- ☐ Si su paciente ha sido transferido de un dispositivo de pluma prellenado diferente, resalte las diferencias en el diseño entre los dos dispositivos (especial atención a la diferenciación del color y las aclaraciones de advertencia en el envase/etiqueta).
- ☐ Explique qué debe prever el paciente con respecto a la disglucemia y las posibles reacciones adversas. Para obtener una lista completa de eventos adversos, consulte el Prospecto de SOLIQUA.
- ☐ Los pacientes ciegos o con visión deficiente deben ser instruidos en que siempre reciban ayuda de otra persona con visión adecuada y que estén capacitados en el uso del dispositivo inyector SOLIQUA SoloStar[®].
- ☐ Indique a sus pacientes que siempre utilicen una nueva aguja antes de cada uso y que nunca usen una jeringa para extraer la solución de la pluma, para evitar errores de dosificación y posibles sobredosis.
- ☐ Recomiende que sus pacientes lean atentamente la guía para el paciente y el folleto de Información para el paciente, así como las instrucciones de uso que se proporcionan en el envase de SOLIQUA SoloStar[®].
- ☐ Informe a los pacientes que monitoreen de cerca sus niveles de azúcar en sangre cuando comiencen con SOLIQUA, que contiene insulina glargina 100 U/ml y un principio activo no insulínica (lixisenatida).

SOLQUA está disponible en dos plumas diferentes:

- SOLQUA que contiene 100 unidades/ml de insulina glargina y 50 microgramos/ml de lixisenatida. Esta pluma debe usarse para administrar entre 10 y 40 pasos de dosis por día (y también se denomina SOLQUA 10-40). Esta pluma tiene un color amarillo con un botón de inyección naranja.
- SOLQUA que contiene 100 unidades/ml de insulina glargina y 33 microgramos/ml de lixisenatida. Esta pluma debe usarse para administrar entre 30 y 60 pasos de dosis por día (y también se denomina SOLQUA 30-60). Esta pluma es de color oliva con un botón de inyección marrón.

Dado que las dos plumas contienen diferentes cantidades de lixisenatida para cada paso de dosis, es importante que no se usen indistintamente, ya que esto haría que los pacientes reciban demasiada o muy poca lixisenatida. Esto podría provocar fluctuaciones en el control de la glucosa en sangre.

Para reducir el riesgo de errores de medicación, materiales educativos incluidas esta “Guía para Profesionales de la Salud” y una “Guía para pacientes” son enviados a los profesionales de la salud pertinentes en los países donde se comercializa el producto y las dos plumas, para aumentar la concientización sobre las diferencias entre las dos plumas, la forma en que se expresa la dosis y cómo usar SOLQUA correctamente.

Como profesional de la salud, haga lo siguiente:

- Entrene a sus pacientes sobre cómo usar SOLQUA correctamente.
- Entregue a sus pacientes la “Guía del paciente” que deben leer atentamente junto con la Información para Pacientes.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA DOSIFICACIÓN

SOLQUA PLUMA 10-40

SOLQUA 100 UNIDADES/ml + 50 MICROGRAMOS/ml
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN EN PLUMA PRELLENADA



- Insulina glargina (100 unidades/ml): 10 a 40 unidades/día
- Lixisenatida (50 mcg/ml): 5 – 20 mcg/día

SOLQUA PLUMA 30-60

SOLQUA 100 UNIDADES/ml + 33 MICROGRAMOS/ml
SOLUCIÓN PARA INYECCIÓN EN PLUMA PRELLENADA



- Insulina glargina (100 unidades/ml): 30 a 60 unidades/día
- Lixisenatida (33 mcg/ml): 10 – 20 mcg/día

TABLA DE DOSIS DE INICIO

- El tratamiento con insulina basal o agonistas del receptor del péptido 1 similar al glucagón (GLP-1) o hipoglucemiantes orales distintos de metformina e inhibidores de SGLT-2, se deben suspender antes del inicio del tratamiento con SOLIQUA.
- La dosis se debe individualizar con base en la respuesta clínica y se titula con base en la necesidad de insulina del paciente.
- La dosis inicial de SOLIQUA se selecciona con base en el tratamiento previo contra la diabetes y a fin de no exceder la dosis de inicio recomendada de lixisenatida de 10 mcg.

		TRATAMIENTO ANTERIOR		
		Pacientes sin tratamiento previo con insulina (Tratamiento antidiabético oral o agonista del receptor de GLP-1)	Insulina glargina (100 unidades/ml)* ≥20 a <30 unidades	Insulina glargina (100 unidades/ml)* ≥30 a ≤60 unidades
Dosis inicial y pluma	Pluma SOLIQUA (10-40)	10 pasos de dosis (10 unidades/5 mcg)**	20 pasos de dosis (20 unidades/10 mcg)**	
	Pluma SOLIQUA (30-60)			30 pasos de dosis (30 unidades/10 mcg)**

* Si se utilizó una insulina basal diferente:

- Para la insulina o la insulina glargina dos veces al día (300 unidades/ml), la dosis diaria total utilizada previamente debe reducirse en un 20 % para elegir la dosis inicial de SOLIQUA.
- Para cualquier otra insulina basal, se debe aplicar la misma regla que para la insulina glargina (100 unidades/ml)

**Unidades de insulina glargina (100 unidades/ml)/mcg de lixisenatida.

- La dosis diaria máxima es de 60 unidades de insulina glargina y 20 mcg de lixisenatida correspondientes a 60 pasos de dosis. En el caso de dosis diarias totales >60 pasos de dosis/día, no se debe usar SOLIQUA.
- La prescripción debe indicar el rango de dosis y la concentración de la pluma prellenada SOLIQUA y la cantidad de pasos de dosis que se deben administrar.

CONSIDERACIONES PARA EL FARMACÉUTICO

Antes de dispensar SOLIQUA, haga lo siguiente:

- Comunicar al paciente cualquier inconsistencia que se detecte en la prescripción médica, para que lo verifique con su médico prescriptor.
- Verifique con el paciente que la pluma dispensada corresponda a la concentración de la pluma que el paciente espera.
- Verifique que los pacientes o cuidadores puedan leer el intervalo de dosis y el indicador de dosis de la pluma prellenada.
- Verifique que los pacientes hayan sido entrenados sobre cómo usar la pluma.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

SOLIQUA se suministra en una pluma prellenada y solo debe utilizarse con este dispositivo; los profesionales de la salud nunca deben usar una jeringa para extraer SOLIQUA de una pluma prellenada ya que pueden producirse errores de dosificación y daños serios.

Consulte el Prospecto de SOLIQUA escaneando el código QR al final del material, para obtener recomendaciones de prescripción adicionales.

Notificación de eventos adversos: Informe los errores de medicación o cualquier efecto secundario que se sospeche que esté asociado con el uso de la pluma SOLIQUA SoloStar® a Sanofi, ya sea por teléfono +595 21 288 1000 o por correo electrónico Farmacovigilancia.Argentina@sanofi.com

Material dirigido exclusivamente a Profesionales de la Salud, con el propósito de brindar información científica y educativa. Este material forma parte del Plan de Gestión de Riesgo.

Sanofi-Aventis Paraguay S.A. - Edificio SkyPark, Aviadores del Chaco N° 2581, Torre 2, Piso 13, Asunción, Paraguay. Tel: (595) 21 288 1000 - www.sanofi.com.py

Versión local 1.0 de Abril 2025, basado en la versión global VV-PV-0474829.

Escanee el código QR para acceder al Prospecto de Información del Producto.

