

Toujeo® (insulina glargina 300 unidades/ml)

Guía para pacientes y/o cuidadores

Si le han recetado Toujeo®, su Profesional de la Salud debe enseñarle a utilizar la lapicera Toujeo® SoloStar® y debe leer el folleto completo de Instrucciones de Uso que acompaña a la lapicera. Este documento se ofrece solo como guía.

✓ Conserve este documento. Es posible que tenga que leerlo de nuevo.

Escriba su nombre en esta tarjeta: _____

✗ Este medicamento ha sido recetado únicamente para usted. No se lo transmita a otras personas. Puede dañarlos, incluso si sus síntomas de enfermedad son los mismos que los suyos

Toujeo® SoloStar® es una lapicera prellenada descartable para inyección, que contiene 300 unidades de insulina glargina por ml. Es una insulina modificada, muy similar a la insulina humana. Toujeo® reduce su azúcar en sangre de forma constante durante un largo período de tiempo. Se utiliza para administrarse una vez al día.



La ventana de dosis de la lapicera Toujeo® SoloStar® muestra el número de unidades de Toujeo® a inyectar.

✗ **No vuelva a calcular la dosis y comience con la dosis en unidades escritas en su orden de prescripción médica**

La insulina glargina 300 unidades/ml (Toujeo®) y la insulina glargina 100 unidades/ml (Lantus®) no son bioequivalentes y, por tanto, no son intercambiables sin ajuste de la dosis (esto significa que los medicamentos no son iguales y que no los debe cambiar entre ellos sin ajustar la dosis).

El cambio de un tratamiento con insulina a otro sólo debe realizarse cuando lo prescriba su Profesional de la Salud. Debe seguirse siempre la dosis recientemente recomendada por su Profesional de la Salud

Es necesario controlar estrechamente su glucemia durante el cambio y las primeras semanas posteriores.

Consulte a su Profesional de la Salud para obtener más información.

Antes de inyectar Toujeo®

■ Lea las instrucciones de uso que acompañan al prospecto.

Si no sigue todas estas instrucciones, es posible que reciba demasiado o muy poca insulina.

! Y recuerde:

Toujeo® 300U/ml es para uso subcutáneo únicamente

Toujeo® 300U/ml no debe ser pasado desde el cartucho de la lapicera prellenada a una jeringa ya que se puede producir una sobredosis grave.

Toujeo® 300U/ml no debe ser usado en bombas de infusión de insulina.

Si experimenta algún efecto secundario, hable con su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no mencionado en el prospecto.

También puede notificar los efectos secundarios a Sanofi enviando un correo electrónico a: farmacovigilancia.argentina@sanofi.com o llamando al +54 11 4732-5000.

MATERIAL DIRIGIDO A PACIENTES. CONSULTE A SU MÉDICO.
Mayor información disponible a petición.

Argentina: Sanofi-Aventis Argentina S.A. Tucumán 1, Piso 4°, C1049AAA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. www.sanofi.com.ar.
Paraguay: Sanofi-aventis Paraguay S.A. Edificio SkyPark, Aviadores del Chaco N° 2581, Torre 2, Piso 13 - Asunción - Paraguay - www.sanofi.com.py
MAT-AR-2402086 - V1.0 - 11/2024 – Versión local 1.0, Julio 2024.



Prospecto Argentina



Prospecto Paraguay