Immunisering og forebygging

sanofi



For å motta mer informasjon om Sanofi-vaksiner,
vennligst skann og abonner.

sanofi

Handelsnavn	*Indikasjon*	*Relevant informasjon*
		Difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt
Repevax®	Aktiv immunisering mot difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt hos personer fra 3 år som booster etter primærvaksinasjon[1].	**Dosering og administrasjonsmåte:** En enkelt dose (0,5 ml) anbefales til alle aldersgrupper hvor legemidlet er indisert. REPEVAX gis intramuskulært, fortrinnsvis i deltamuskelen. **Kontraindikasjoner:** Kjent overfølsomhet mot difteri-, tetanus-, kikhoste- eller poliovaksiner. Overfølsomhet over andre bestanddeler i vaksinen eller reststoffer som kan være igjen etter produksjonen. **Bivirkninger:** Alle aldersgrupper: *Svært vanlige (≥1/10):* Øvrige: Smerte/hevelse/erytem på injeksjonsstedet, tretthet/asteni[1]. AIP 1 pakning: 196,65. 10 pakning: 1966,50.
		Rabies
VERORAB®	Indisert til pre- og post-eksponeringsprofylakse mot rabies hos alle aldersgrupper. Skal brukes i henhold til offisielle anbefalinger[2].	**Dosering og administrasjonsmåte:** Den anbefalte dosen er 0,5 ml rekonstituert vaksine intramuskulært eller 0,1 ml rekonstituert vaksine intradermalt på hvert injeksjonssted. Det primære immuniseringsregimet ved preeksponering består av tre doser à 0,5 ml administrert intramuskulært på dagene D0, D7 og D28. Kan administrares både intramuskulært og intradermalt. **Kontraindikasjoner:** Overfølsomhet overfor virkestoffet(ene), hjelpestoffene eller ovenfor polymyksin B, streptomycin, neomycin (til stede med spor i vaksinen) eller ethvert antibiotikum av samme klasse. Vaksinen bør utsettes i tilfelle febril eller akutt sykdom. **Bivirkninger:** Alle aldersgrupper: *Svært vanlige (≥1/10):* Muskel-skjelettsystemet: Myalgi, Øvrige: smerte/erytem(intradermal) på injeksjonsstedet, malaise[2]. AIP 1 sett: 644,27.
		Tyfoidfeber
TYPHIM Vi™	Indisert for aktiv immunisering mot tyfoidfeber forårsaket av Salmonella enterica serovar typhi, S. typhi hos voksne og hos barn fra og med 2 år[3].	**Dosering og administrasjonsmåte:** Voksne og barn fra og med 2 år: En enkel dose på 0,5 ml. Foretrukket administrasjonsvei for denne vaksinen er intramuskulær, men den kan også gis subkutant. **Kontraindikasjoner:** Kjent systemisk overfølsomhetsreaksjon overfor komponenter i vaksinen, eller en livstruende reaksjon etter tidligere administrasjon av en vaksine som inneholder de samme stoffene. Injeksjon av Typhim Vi må utsettes hos pasienter med akutt febersykdom. **Bivirkninger:** *Svært vanlige (≥1/10)* alle aldre: Myalgi[3]. AIP: 1 pakning 155,72. 10 pakning 1557,20.
		Gulfeber
STAMARIL™	Aktiv immunisering mot gulfeber[4].	**Dosering og administrasjonsmåte:** Primærvaksinasjon: Vaksinen bør gis minst 10 dager før innreise til endemisk område for å oppnå beskyttelse. Voksne: 1 dose à 0,5 ml rekonstituert vaksine. Barn fra 9 måneders alder: én dose på 0,5 ml av den rekonstituerte vaksinen. Subkutan injeksjon av vaksinen er foretrukket. **Kontraindikasjoner:** Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene eller egg eller kyllingprotein. **Bivirkninger:** *Svært vanlige (>_≥1/10):* Tap av apetitt, søvnighet, hodepine, YEL-AND, krampeanfall, aseptisk meninggitt, oppkast, myalgi, irritabilitet, gråt, pyreksi, asteni, smerte/ømhet på injeksjonsstedet[4]. AIP 1 sett: 469.09.
		Influensa*
Eflueldа®	Indisert for aktiv immunisering av voksne fra 60 år og eldre for forebygging av influensasykdom[5].	**Dosering og administrasjonsmåte:** én dose på 0,5 ml. Foretrukket administrasjonsvei for denne vaksinen er intramuskulært, men den kan også gis subkutant. **Kontraindikasjoner:** Overfølsomhet ovenfor virkestoffene, hjelpestoffene eller noen av substansene som kan være til stede i spormengder slik som egg og formaldehyd. **Bivirkninger:** *Svært vanlige (≥ 1/10):* Smerter på injeksjonsstedet, erytem på injeksjonsstedet, malaise, myalgi og hodepine[5]. Pris AIP 1 pakning: 371,71.
Vaxigrip®	Indisert for forebygging av influensasykdom. Aktiv immunisering av voksne, inkludert gravide, og barn fra 6 måneders alder og oppover. Passiv beskyttelse av nyfødte fra fødsel og opptil 6 måneders alder etter vaksinasjon av gravide kvinner[6].	**Dosering og administrasjonsmåte:** Voksne: én dose på 0,5 ml. Foretrukket administrasjonsmåte for denne vaksinen er intramuskulært selv om den også kan gis subkutant. **Kontraindikasjoner:** Overfølsomhet overfor virkestoffene, hjelpestoffene eller overfor sporstoffer som for eksempel egg, neomycin, formaldehyd og oktoksinol-9. **Bivirkninger:** *Svært vanlige (≥ 1/10):* Hodepine, myalgi, smerter på injeksjonsstedet, malaise[6]. AIP 1 pakning: 127,60. AIP 10 pakning: 1276,00.

* Influensavaksiner er sesongbaserte og tilgjengelige i en avgrenset periode hvert år, vanligvis fra oktober. Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker mer informasjon om tilgjengelighet av sesongbaserte vaksiner.

For fullstendig preparatomtale, se legemiddelsøket hos DMP for hvert enkelt produkt: www.legemiddelsok.no.
Finn anbefalte råd om vaksiner hos FHI: https://www.fhi.no/

For å finne ut mer om Sanofi-vaksiner, vennligst skann og besøk våre nettsider.

Referanser:

1. Repevax SPC 2. Verorab SPC 3. Typhim Vi SPC 4. Stamaril SPC 5. Eflueldа SPC 6. Vaxigrip SPC

MAT-NO-2500404 - V1.0 - 01/2026