

Beyfortus® está indicado para la prevención de la enfermedad de las vías respiratorias inferiores causada por el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en:<sup>1</sup>

- Recién nacidos y lactantes cursando su primera temporada de VSR.
- Niños hasta 24 meses de edad que continúen siendo vulnerables a padecer enfermedad por el VSR severa.


## Cómo utilizar Beyfortus®

### Dosis recomendada

En la primera temporada una única administración en función del peso del bebé utilizando una jeringa prellenada lista para usar.<sup>\*1</sup>

Una inyección intramuscular, preferiblemente en la cara anterolateral del muslo.<sup>1</sup>

La dosis recomendada en la segunda temporada es de 200 mg administrada en dos 2 inyecciones intramusculares de 100mg cada una (2X100 mg)<sup>1</sup>



### Momento de la administración



**Para los niños nacidos durante la temporada de VSR, Beyfortus® debe de administrarse después del nacimiento!** Por ejemplo, podría administrarse después del nacimiento, antes del alta hospitalaria o durante la consulta con su médico de confianza.



**En niños que han nacido antes de la temporada de VSR, Beyfortus® debe de administrarse antes del inicio de su primera temporada de VSR.**<sup>1</sup> Por ejemplo, podría administrarse durante la consulta con su médico de confianza desde octubre, lo antes posible para estar protegido desde el inicio de la temporada.<sup>\*\*\*</sup>



**En niños de hasta 24 meses de edad que continúen siendo vulnerables a padecer enfermedad por VSR severa durante su segunda temporada de VSR, Beyfortus® debe de administrarse antes del inicio de la segunda temporada.**<sup>1</sup>



Beyfortus® se puede administrar **concomitantemente con otras vacunas infantiles.**<sup>\*\*1</sup>

<sup>\*</sup>El músculo glúteo no se debe utilizar de forma rutinaria como lugar de inyección, ya que existe el riesgo de dañar el nervio ciático.<sup>1</sup>

<sup>\*\*</sup>Beyfortus® no se debe mezclar con ninguna vacuna en la misma jeringa o vial. Cuando se administra concomitantemente con vacunas inyectables, se debe administrar con jeringas separadas y en diferentes lugares de inyección.<sup>1</sup>

<sup>\*\*\*</sup>Beyfortus® puede administrarse en cualquier momento de la temporada de VSR, idealmente antes del inicio de la temporada.<sup>1</sup>

## Cómo almacenar Beyfortus®

### Almacenamiento<sup>1</sup>

- Consérvese en refrigeración, entre 2°C y 8°C.
- No se congele.
- No agitar o exponer a calor directo.
- Conserve la jeringa prellenada en la caja para protegerla de la luz



### Periodo de vida<sup>1</sup>

Beyfortus® puede mantenerse a temperatura ambiente (20°C a 25°C) cuando está protegida de la luz, por un máximo de 8 horas. Después de este tiempo, la jeringa debe ser desechada.



<sup>1</sup> Información para prescribir Beyfortus®. Sanofi Winthrop Industrie 23 de mayo del 2025.

▼ Este medicamento debe ser utilizado exclusivamente bajo prescripción y vigilancia médica y no puede repetirse sin nueva receta médica.