



XENPOZYME  
(Olipudase alfa)



(Stand: März 2026)

Diese Patientenkarte enthält wichtige Informationen, über die Sie bei Ihrer Behandlung mit XENPOZYME® informiert sein müssen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation oder scannen Sie den QR-Code.

## PATIENTENKARTE

Name des Patienten: \_\_\_\_\_

Datum der Erstverordnung von XENPOZYME®: \_\_\_\_\_

**Name des Zentrums:** \_\_\_\_\_

**Notfall-Telefonnummer des Zentrums:** \_\_\_\_\_

**Notarzt: 144** \_\_\_\_\_

Name des behandelnden Arztes: \_\_\_\_\_

Telefonnummer des behandelnden Arztes: \_\_\_\_\_

## Wichtige Nebenwirkungen

XENPOZYME® wird als intravenöse Infusion verabreicht. Bei Patienten können während oder nach der Infusion häufig Überempfindlichkeitsreaktionen und anaphylaktische Reaktionen auftreten, die jeweils eine sofortige Behandlung erfordern.

Wenn eines der folgenden Anzeichen und Symptome während oder nach der Infusion auftritt oder sich verschlimmert, **informieren Sie umgehend Ihren Arzt und nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch:**

- Kurzatmigkeit, Erstickungsgefühl
- Verwirrtheit, Schwäche- oder Ohnmachtsanfall
- Schneller und schwacher Puls
- Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall
- Hautrötung oder blasse Haut, Nesselsucht, Juckreiz

Berichten Sie bitte grundsätzlich jede Nebenwirkung Ihrem behandelnden Arzt.

## Wichtige Informationen für Frauen im gebärfähigen Alter

Kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt, wenn Sie schwanger sind, vermuten, schwanger zu sein, oder beabsichtigen, schwanger zu werden oder zu stillen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt über die Notwendigkeit wirksamer Maßnahmen zur Empfängnisverhütung während der Behandlung sowie bei Absetzen von XENPOZYME® bis 14 Tage nach der letzten Dosisgabe.