

TIÊM NHẮC BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ, BẠI LIỆT

CHO TRẺ TỪ 4-6 TUỔI



TIÊM NHẮC
BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ, BẠI LIỆT

CHO TRẺ TỪ 4-6 TUỔI

GIÚP TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG BẢO VỆ TRẺ
KHỎI CÁC BỆNH NGUY HIỂM NÀY

Hãy quét mã QR để tìm hiểu thêm về
tiêm chủng, chi tiết bệnh và vắc-xin qua
nguồn thông tin đáng tin cậy.



Facebook Fanpage
Hiếu Về Tiêm Chủng



Tài trợ bởi
sanofi

Thông tin được cung cấp bởi Hội Nhi Khoa Việt Nam
Được tài trợ in ấn bởi Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam,
thuộc tập đoàn Sanofi của Pháp

MAT-VN-2400424 1.0 04/23



Tài trợ bởi
sanofi

**BỎ QUA TIÊM NHẮC^(*)
LIỆU MẸ AN TÂM?**

THÔNG TIN DÀNH CHO PHỤ HUYNH

CÓ CON TỪ 4-6 TUỔI




(*) Tiêm nhắc: đối với một số bệnh, kháng thể bảo vệ từ những lần tiêm vắc-xin trước đó sẽ giảm theo thời gian, tiêm nhắc giúp tăng cao lượng kháng thể, từ đó giúp bảo vệ trẻ khỏi bệnh.

MAT-VN-2400424 1.0 04/23

VÌ SAO “**HIỆP SĨ NHÍ**” CỦA BẠN CẦN PHẢI TIÊM NHẮC BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ, BẠI LIỆT

KHI BƯỚC VÀO TUỔI 4-6?



Khi trẻ bước vào giai đoạn 4-6 tuổi, **kháng thể** ngừa các bệnh Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Bại liệt mà trẻ có được từ những mũi tiêm 6 trong 1 hoặc 5 trong 1 trong 2 năm đầu đời đã giảm đi. Điều đó có nghĩa là trẻ có khả năng mắc bệnh nếu chẳng may tiếp xúc với nguồn lây.

Hơn nữa, trẻ 4-6 tuổi, **môi trường tiếp xúc của trẻ đa dạng hơn**, trẻ đi học, đi chơi... làm cho nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm tăng lên

Việc tiêm nhắc **Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Bại liệt** khi trẻ được **4-6 tuổi** sẽ giúp tăng cường khả năng bảo vệ trẻ khỏi các bệnh nguy hiểm này

CÁC LOẠI VẮC-XIN NGỪA BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ, BẠI LIỆT MÀ BA MẸ CÓ THỂ LỰA CHỌN ĐỂ TIÊM NHẮC CHO “**HIỆP SĨ NHÍ**” CỦA BẠN

Vắc-xin 4 trong 1
Giúp ngừa 4 bệnh Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà và Bại liệt

Vắc-xin 3 trong 1
Giúp ngừa 3 bệnh Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà

MAT-VN-2400424 1.0 04/23

BẠCH HẦU

ĐƯỜNG LÂY

Lây lan qua đường hô hấp hoặc gián tiếp khi tiếp xúc với đồ chơi, vật dụng có dính chất bài tiết của người bị nhiễm vi khuẩn Bạch hầu

BIỂU HIỆN

Sốt, đau họng, giả mạc ở vùng giả hầu họng có thể gây tắc nghẽn đường thở

BIẾN CHỨNG

Độc tố Bạch hầu có thể gây viêm cơ tim, viêm dây thần kinh, hoại tử ống thận...

“ Điều đáng lưu ý tại Việt Nam hằng năm vẫn ghi nhận **các ca mắc và tử vong** do bệnh Bạch hầu, và các ca này rơi phần lớn vào trẻ từ 5 tuổi trở lên, thanh thiếu niên hoặc người lớn **do các đối tượng này không có đủ kháng thể bảo vệ**.”

Nguồn: 1. Bệnh bạch hầu, vì sao hằng năm vẫn còn ca mắc? - Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn)

UỐN VÁN

ĐƯỜNG LÂY

Bào tử Uốn ván xâm nhập qua các vết thương hở

BIỂU HIỆN

Sốt, co cứng cơ, cứng hàm, khó nuốt

BIẾN CHỨNG

Co thắt thanh quản, khó thở, gãy xương, thuyên tắc phổi, viêm phổi hít...

“ Trẻ 4-6 tuổi năng động, việc trầy xước là **điều khó tránh khỏi**. Do đó, ba mẹ cần chủ động **phòng ngừa Uốn ván** cho trẻ **bằng việc tiêm nhắc**.”

https://ehsaihuoc.com/uoan-van

MAT-VN-2400424 1.0 04/23

HO GÀ

ĐƯỜNG LÂY

Bệnh lây qua giọt bắn đường hô hấp

BIỂU HIỆN

Sốt nhẹ, cơn ho kịch phát kéo dài, nôn ói trong cơn ho/sau ho

BIẾN CHỨNG

Có thể đưa đến viêm phổi, co giật, ngưng thở, tử vong

BẠI LIỆT

ĐƯỜNG LÂY

Bệnh lây qua đường phân-miệng

BIỂU HIỆN

Sốt, mệt mỏi, đau đầu, nôn ói, cứng cổ, đau cơ...

BIẾN CHỨNG


Một số trường hợp bị liệt không hồi phục và có thể tử vong do liệt cơ hô hấp (không thở được)

“ Trong những năm gần đây, **các quốc gia gần Việt Nam** đã ghi nhận các ca mắc Bại liệt. Cụ thể, từ tháng 12/2023 đến tháng 01/2024, Indonesia đã ghi nhận **3 ca mắc** Bại liệt¹. Và trong năm 2022, ở những quốc gia tiên tiến như Mỹ và Anh, người ta đã phát hiện **virus Bại liệt** trong môi trường sống^{2,3}. Đặc biệt, hiện nay việc di chuyển giữa các Quốc gia rất dễ dàng làm tăng khả năng lây lan bệnh tật.”

Nguồn: 1. Indonesia detects 3 acute flaccid paralysis cases caused by poliovirus - ANTARA News
2. New York ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi phát hiện virus bại liệt trong nước thải - Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn)
3. New York ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi phát hiện virus bại liệt trong nước thải - Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn)

MAT-VN-2400424 1.0 04/23

Mũi tiêm nhắc phòng các bệnh Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Bại liệt lúc con 4-6 tuổi giúp bảo vệ con đến giai đoạn tiếp theo thanh thiếu niên. Khi bước vào giai đoạn 9-15 tuổi, trẻ cần thêm 1 liều nhắc nữa phòng Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà. Bên cạnh 4 bệnh Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Bại liệt, trẻ cần được tiêm nhắc thêm các bệnh khác như Viêm Não Nhật Bản, Sởi - Quai Bị - Rubella, Cúm, Viêm màng não do não mô cầu, ba mẹ vui lòng tham khảo thêm ý kiến của Bác sĩ để được tư vấn chi tiết giữa con.



HIỆP SĨ NHÍ KHÔNG SỢ MŨI TIÊM BÉ TÍ



Họ và tên:

Tuổi:

Các “Hiệp sĩ nhí” hãy cùng Bác sĩ dán sticker ngay sau khi hoàn thành mũi tiêm nha!



BỆNH	TÊN VẮC-XIN	NGÀY TIÊM	BÁC SĨ KÝ TÊN	CÙNG DÁN STICKER NÀO
Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà, Bại liệt				
Sởi - Quai Bị - Rubella				
Cúm				
Viêm màng não do não mô cầu				
Viêm gan A				
Thương hàn				

Lưu ý: đây là lịch tiêm nhắc dành cho trẻ 4-6 tuổi, ba mẹ cần tư vấn với Nhân viên y tế để có lịch tiêm đầy đủ cho trẻ





Tài trợ bởi
sanofi



PHỤ HUYNH CÓ CON

TRONG ĐỘ TUỔI TỪ 4-6

HÃY ĐẢM BẢO **"HIỆP SĨ NHÍ"** CỦA BẠN
ĐƯỢC TIÊM NHẮC ĐẦY ĐỦ VÀ ĐÚNG LỊCH NHÉ!

HIỆP SĨ NHÍ



Các “Hiệp sĩ nhí” hãy cùng Bác sĩ dán sticker ngay sau khi hoàn thành mũi tiêm nha!

